Verkrijgbaar bij den Plantenziektenkundigen Dienst. PRIJS f 0.40
Franco p. p.

VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST TE WAGENINGEN, No. 33.

SPROEIEN EN SPROEIERS

DERDE HERZIENE DRUK

NOVEMBER 1931
DRUK: H. VEENMAN & ZONEN, WAGENINGEN

IMPERIAL MYCOLOGICAL INSTITUTE
19 FEB. 1932

INHOUD

Blz.

Inleiding 1
Ziekten en beschadigingen:
ooftgewassen 2
boomkweekerijgewassen 9
bloemgewassen 14
groenten 15
landbouwgewassen 17
Sproeimiddelen:
contactgiften 19
maaggiften 23
ademhalings- en zenuwgiften 25
fungiciden 25
Uitvoering der bespuitingen 29
Sproeiwerktuigen 31
Berekening der spuitkosten 46
Verklaring der afbeeldingen 50

SPROEIEN EN SPROEIERS

VOORWOORD

Onze Mededeeling No. 33, Sproeien en Sproeiers, heeft zooveel belangstelling ondervonden, dat in het begin van 1931 daarvan reeds een tweetal drukken was uitgeput. De uitgave van een derde herziene druk is eenigen tijd uitgesteld, in verband met de groote wijzigingen, die juist den laatsten tijd in de voor bespuiting van boomgaarden gebruikte apparaten, tot stand kwamen. Nu de propaganda voor meer en beter fruit de volstrekte noodzakelijkheid van meerdere bespuitingen in een seizoen, ter bestrijding van insecten en ziekten, heeft aangetoond, is in zeer korten tijd het gebruik van motorsproeimachines in ons land zeer sterk toegenomen. In 1926 werd in den tweeden druk onzer Mededeeling vermeld: *enkele motorspuiten zijn reeds in ons land in gebruik*. Thans, in 1931, heeft dit aantal de honderd reeds overschreden en het neemt nog steeds snel toe.

In verband hiermede moest de inhoud der Mededeeling geheel herzien worden. Hoewel het mogelijk is, dat door de vooruitgang in de techniek weldra weer andere modellen zullen moeten worden genoemd, kan thans, daar het nieuwe sproeiseizoen spoedig aanbreekt, niet langer met het publiceeren van een leidraad worden gewacht.

De inhoud van den hierbij verschijnenden derden druk is herzien door Ir. P. Hus, phytopatholoog bij den Plantenziektenkundigen Dienst. Van een aantal gegevens over motorsproeiers, die door de heeren Ir. G. Brouwers, rijkslandbouwingenieur en Ir. D. Bloemsma, rijkstuinbouwconsulent verzameld en door dezen welwillend te onzer beschikking gesteld zijn, is gaarne gebruik gemaakt, waarvoor ik aan genoemde heeren gaarne mijn dank betuig.

De machines voor het verstuiven van poedervormige bestrijdingsmiddelen worden in dezen nieuwen druk niet meer genoemd. Zij zullen in een afzonderlijke publicatie, die over eenigen tijd zal verschijnen, worden opgenomen.

De Inspecteur, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst,

Wageningen, October 1931. N. van Poeteren.

SPROEIEN EN SPROEIERS

Een der belangrijkste methoden voor de bestrijding van plantenziekten is het sproeien, d.w.z. het aanwenden van bestrijdingsmiddelen in vloeibaren, opgelosten of wel zwevenden, toestand. Voor den land- en tuinbouwer, die sproeimiddelen zal aanwenden, is het van het meeste belang, dat hij weet:

1°. of er ziekten in zijn gewassen voorkomen, die met sproeimiddelen voorkomen of bestreden kunnen worden;
2°. met welke middelen deze voorkomen of bestreden kunnen worden;
3°. hoe deze middelen worden aangewend en wanneer;
4°. welke werktuigen daarbij kunnen worden gebruikt.

Slechts indien hij deze kennis bezit, kan hij een doelbewuste en rationeele bestrijding toepassen en alleen deze kan op den duur loonend zijn. Dit boekje heeft tot doel aan allen, die daaraan behoefte hebben, aanwijzingen te verschaffen over de gevallen, waarin een bespuiting [1]) ter bestrijding van plantenziekten kan worden aangewend, de middelen te leeren kennen, die daarbij kunnen worden toegepast en de wijze aan te geven, waarop de bespuiting moet worden uitgevoerd. Voor uitvoerige beschrijvingen over ziekten en beschadigingen en de te gebruiken bestrijdingsmiddelen zij, voor zoover dit niet reeds geschied is, verwezen naar de lijst van Mededeelingen en Vlugschriften, voorkomende op den omslag. In alle gevallen, waarin men hulp en voorlichting wenscht te ontvangen omtrent de wenschelijkheid of noodzakelijkheid eener bespuiting en over de uitvoering, wende men zich tot den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen of tot een der buiten Wageningen werkzaam gestelde ambtenaren.

---

[1]) Uitdrukkelijk zij er op gewezen, dat hier uitsluitend **sproei**middelen worden aangegeven. Indien de hier aangeduide ziekten *ook* door andere middelen (b.v. bestuivingen) kunnen worden bestreden, is dit in deze brochure (met slechts enkele uitzonderingen) niet aangegeven.

I. WELKE ZIEKTEN OF BESCHADIGINGEN KUNNEN DOOR EEN BESPROEIING VOORKOMEN OF BESTREDEN WORDEN?

OOFTBOOMEN EN -STRUIKEN

Appel

Schurft. Het blad wordt, hoofdzakelijk aan de bovenzijde, gedeeltelijk bedekt met een olijfgroen laagje. Op de vruchten ontstaan bruinzwarte vlekken.

Korten tijd vóór den bloei spuiten met 1½% Bordeausche pap. Latere bespuitingen met Bordeausche pap geven aanleiding tot blad- en vruchtbeschadiging, daarom voor de latere bespuitingen Californische pap (1 deel op 40 à 60 deelen water) gebruiken.

Het tijdstip voor de tweede bespuiting wordt door sommigen direct na den bloei, door anderen enkele weken later gekozen. Als tevens de wormstekigheid bestreden moet worden, dient men direct na den bloei te spuiten, voor de schurftbestrijding is een iets later tijdstip in den regel beter; de derde bespuiting, welke vaak achterwege blijft, doch ook zeer gewenscht is (zelfs meer bespuitingen zijn wenschelijk), wordt ongeveer een maand na de tweede bespuiting uitgevoerd. Het weer (regen) heeft grooten invloed op het optreden van de schurft, daarom kan niet streng aan de opgegeven tijdstippen vastgehouden worden. Het verdient aanbeveling de bespuitingen, zooveel mogelijk, direct na een regenperiode uit te voeren.

Voor het telen van zeer mooi fruit zijn drie bespuitingen dikwijls niet voldoende, een vierde, vijfde, soms wel zesde bespuiting is noodig, ook voor die latere bespuitingen kan Californische pap 1 : 40 à 60 gebruikt worden. Alleen in droge, zonnige zomers kan men met een slappere oplossing, bv. 1 : 100 goede resultaten bereiken. Voor gevoelige soorten zie blz. 18, Mededeeling 50.

Meeldauw. Jonge scheuten en bladeren worden met een wit melig laagje zwamweefsel bedekt. De bladeren krullen en verdrogen, de aangetaste scheuten sterven af.

Kort vóór den bloei spuiten met Californische pap (1 deel pap + 15 deelen water). Een latere bespuiting met 1 deel pap op 40 deelen water, zoodra de meeldauw zich vertoont, verdient eveneens aanbeveling, ook 1% Solbar geeft goede resultaten.

Schildluizen. Op stammen en takken komen de luizen voor, welke onder een komma- of mosselvormig schildje verborgen zijn.

Winterbespuiting (Febr., Maart) met 7½% carbolineum.

Bladluizen. De luizen zuigen aan de onderzijde der bladeren, waardoor deze gaan krullen, jonge scheutjes groeien soms krom.

's Winters komen de glimmende zwarte eitjes op stammen en takken, meestal bij de knoppen, voor.

Winterbespuiting met 7½% carbolineum.

Bloedluis. In oude wonden en spleten aan stam en takken vertoonen zich witte donzige plekjes. Bij sterke aantasting zijn de éénjarige scheuten voor een groot deel met deze witte hoopjes bedekt, op de aangetaste plekken ontstaan ook kankerachtige knobbels.

Moeilijk te bestrijden; zorgvuldige winterbespuiting met 10% carbolineum geeft wel eenig resultaat. Ook over bespuitingen met Zesopea (zie blz. 22) zijn sommigen tevreden.

Appelwants. Bladeren vertoonen gaten en scheuren, vruchten krijgen verkurkte vlekken en bobbels. Op de eenjarige twijgen wordt pleksgewijs de bast beschadigd, boven de beschadigde plek is de tak gedrongen, daar staan de knoppen dichter dan gewoonlijk bij elkander.

Winterbespuiting met 10% van een speciaal voor dit doel vervaardigde carbolineumsoort.

Zeer goede resultaten worden ook verkregen door ongeveer 10 dagen, voordat de appels in vollen bloei staan, te spuiten met nicotine (1 deel zuivere nicotine op 1000 à 1500 deelen water). Toevoeging van 1% zeep verhoogt de werking.

Spint. Deze ziekte kan veroorzaakt worden door tot verschillende geslachten behoorende mijtsoorten, waarvan er één aan de bovenzijde der bladeren leeft (*Bryobia*), de andere aan de onderzijde (*Paratetranychus*).

De eerste soort is zeer goed te bestrijden met een 7½% carbolineumoplossing, toe te passen in den winter. De mijten der tweede groep worden door deze bespuiting niet geheel afdoende bestreden. vooral niet wanneer zeer vroeg wordt gespoten. Het beste resultaat wordt verkregen, wanneer gespoten wordt zoo laat in den tijd, als de ontwikkeling der boomen toelaat.

Er wordt reeds gebruik gemaakt van vruchtboomcarbolineum, waaraan een petroleumpreparaat toegevoegd is. Door deze toevoeging wordt de werking tegen spint verhoogd. Ons bereikten nog niet voldoende gegevens om een oordeel over deze gewijzigde carbolineum te vellen.

Een der oudste methoden is een bespuiting in het begin van den zomer met een zwavelleveroplossing (0.4% = 4 gram zwavellever per liter water) met tarwebloempap; zie voor bereiding vlugschr. 36. Ook bespuitingen met andere zwavelpreparaten, b.v. Californische pap 1 : 40 of Solbar 1% geven goede resultaten. Beter nog werken petroleumpreparaten, waarvan Volck de bekendste is. Hiervan wordt een 1% oplossing gebruikt.

Wormstekigheid. Een rupsje vreet het klokhuis en omgeving uit, meestal dringt het door de kelkholte naar binnen. (Niet te verwarren met de larve der appelzaagwesp, zie Med. 20).

Direct na den bloei (voordat de kelkblaadjes de kelkholte afsluiten)spuiten met 0.1% Parijsch of Uraniagroen of met 0.3% poedervormig loodarsenaat; 1% kalk toevoegen met het oog op bladverbranding.

Appelzaagwesp. De larven van deze wesp komen reeds vroeg in den zomer in de appels voor en veroorzaken ook een vorm van wormstekigheid. De wormstekige appels, die in Juni en begin Juli vallen, zijn vrijwel uitsluitend door de appelzaagwesplarven aangetast.

Door een bespuiting met nicotine (1 deel nicotine op 1000 à 1250 deelen water) + 1 % zeep, binnen een week na het vallen der bloemblaadjes, kan de beschadiging voor een groot deel voorkomen worden.

Trekmade. (rups van den kleinen wintervlinder) Groenachtige rupsjes vreten blad- en bloemknoppen. In de bladeren worden vrij groote gaten gevreten, ook jonge vruchtjes worden beschadigd.

Winterbespuiting met 7½% carbolineum. Zoodra vreterij wordt waargenomen, spuiten met 0.1% Parijsch- of Uraniagroen of 0.3% poedervormig loodarsenaat (Bekend is de bestrijding door middel van lijmbanden, zie Med. No. 3). Het gedeelte van den stam beneden de lijmbanden moet in het voorjaar met 10% carbolineum bespoten worden om de eitjes, welke daar zijn gelegd, te dooden.

Bladvloo. Kleine, groene, eenigszins op bladluizen gelijkende insecten zuigen reeds aan de juist ontluikende knoppen waardoor de vruchtzetting sterk belemmerd kan worden. Ook de bladeren worden misvormd. (kroes)

De overwinterende eieren worden door een winterbespuiting met 7½% vruchtboomcarbolineum gedood. In den zomer geven bespuitingen met nicotinepreparaten goede resultaten.

Wieren en Korstmossen. De op stam en takken van oudere, soms ook van jonge, boomen voorkomende wieren (groen) en korstmossen (grijs) worden gedood door een bespuiting met een 7½% carbolineumoplossing in den winter.

Peer

Schurft. Vlekjes op de bladeren kleiner dan bij appel, vruchten met vlekken en meermalen gebarsten, behandeling als bij appel.

Bespuiting met Californische pap mag niet bij fellen zonne-

schijn plaats hebben wegens gevaar voor bladverbranding, liefst niet meer dan 2% gebruiken.

In plaats van Californische pap kan bij sommige soorten voor de tweede en derde bespuiting ook ¾% Bordeauxsche pap gebruikt worden.

Pokziekte. Aanvankelijk groene of roode, later bruine opzwellingen op de bladeren, in den regel langs de hoofdnerf.

Tegen het uitloopen der knoppen spuiten met Californische pap (1 deel pap en 5 deelen water) of met 7½% carbolineumoplossing.

Spint. Zie bij appel.

Schildluizen. Als bij Appel.

Wormstekigheid. Zelfde behandeling als bij appel.

Trekmade. Zie bij appel.

Pruim

Bladluizen. Er komen twee soorten luizen voor: gewone, die de bladeren door hun zuigen kroes maken en wit bepoederde, welke de bladeren niet doen omkrullen.

Winterbespuiting (Jan.-Febr.) met 7½% carbolineum.

Tegen de witbepoederde luis kan men zomers ook met zeepspiritus of met nicotine spuiten.

Trekmade. Als bij appel en peer.

Moniliaziekte. In het voorjaar worden plotseling geheele takken tijdens of na den bloei bruin en sterven af. De vruchten rotten aan den boom en worden met geelgrijze zwamkussentjes bedekt. Een bespuiting met een 7½% carbolineumoplossing in den winter heeft in verschillende gevallen een zeer gunstig resultaat opgeleverd. Een bespuiting met 1 à 1½ % Bordeauxsche pap, kort vóór het uitloopen der knoppen, heeft ook een gunstigen invloed.

Pruimenzaagwesp. De larven boren zich in de pas gezette vruchten in en vreten de nog weeke kern op. Vaak verlaten zij de eene vrucht om andere aan te tasten.

Tweemaal spuiten met een maagvergif (0.3% poedervormig loodarsenaat), direct na den bloei en 8—14 dagen later.

Perzik

Krulziekte. Bladeren blaasvormig, bultig opgezwollen en gekromd, kleur geelgroen, ook wel roodachtig. Aangetaste bladeren worden met een wit fluweelachtig waas bedekt.

Enkele weken voor het uitloopen der knoppen spuiten met

Californische pap (1 deel pap + 7 deelen water).

Dopluizen. De luizen, later de eitjes, zijn met een bolrond, notedopachtig schild bedekt. Bij sommige soorten zijn de eitjes gehuld in een wasachtige massa, die van onder het schild te voorschijn komt.

Perziken in de kas spuiten met 5% carbolineum (Dec.-Jan.).

Sommige kweekers spuiten eenige uren na de carbolineumbespuiting na met schoon water. Om verbranding der knoppen te voorkomen, is dit wel gewenscht.

Bij perziken buiten kan de bespuiting later (Jan.-Febr.) uitgevoerd worden.

Bladluizen. Bladeren sterk gekroesd en bobbelig. De toppen der jonge scheutjes sterven af.

Winterbehandeling met 5% carbolineum, in de kas (Dec.-Jan), buiten (Jan.-Febr.). Naspuiten met water gewenscht.

Spint. Kleine witte vlekjes op de bladeren, het blad krijgt een grauwe kleur.

Winterbehandeling met 5% carbolineum.

's Zomers kan daarop een bespuiting met 0.4% zwavellever en tarwebloempap volgen; zie vlugschr. 36, ook bespuitingen met petroleumpreparaten (1% Volck) geven goede resultaten. (Zie ook bij appel).

Kers

Trekmade. Zie bij appel en peer.

Bladluizen. Zie bij appel en peer.

Monilia. Bloesem sterft plotseling, later volgen de éénjarige twijgen, vruchten verdrogen.

Winterbespuiting met 7½% vruchtboomcarbolineum, gevolgd door een bespuiting met 1½% Bordeauxsche pap kort vóór het opengaan der knoppen.

Aalbessen

Bladluizen. Op roode en witte aalbessen komen verscheidene soorten luizen voor. Eén soort veroorzaakt roode opzwellingen aan de bovenzijde van het blad, een andere soort tast vooral de bladeren in den top van de scheuten aan. Deze bladeren worden sterk gekroesd (kroeskoppen). De scheuten zelf krommen zich soms vrij sterk.

Beide soorten worden bestreden met een carbolineum-bespuiting (7½%) in den winter (Jan.-Febr.).

Wantsen. Op een aangetast blad zijn kleine gaatjes onregelmatig verspreid.

Winterbespuiting met 7½% carbolineum niet afdoende, betere resultaten met speciaal voor dit doel bereide carbolineum.

Bessenbladwesp. De bastaardrupsjes, grijsgroen van kleur met zwarten kop en zwarte wratjes op het lichaam, vreten aan het blad, waarvan alleen de nerven overblijven.

Zoodra vreterij waargenomen wordt, spuiten met 0.1% Parijsch- of Uraniagroen of met 0.3% poedervormig loodarsenaat of met 2% bariumchloride, niet spuiten tijdens den bloei met het oog op vergiftiging van bijen.

Kan door bespuiting in den winter niet bestreden worden.

Bessenspruitvreter. In het voorjaar dringen kleine rupsjes in de knoppen en vreten deze uit, later boren zij zich ook in jonge scheutjes, die dan afsterven.

Winterbespuiting (Febr.) met 7½% carbolineum is afdoende.

Trekmade. (wintervlinder) Zie bij appel en peer.

Bladvalziekte. Kleine geelbruine vlekjes op het blad. Later vloeien de vlekjes samen tot groote vlekken, het blad valt spoedig af.

Winterbespuiting met 10% carbolineum.

Voorjaarsbespuiting vlak na den bloei met 1½% Bordeauxsche pap, herhalen direct na den pluk.

Zwarte bessen

Rondknop. De door de mijten bewoonde knoppen zwellen sterk op, doch loopen in het voorjaar niet of onvolkomen uit. Vooral in het voorjaar verspreiden zich de mijten.

Spuiten met sterke Californische pap (1 deel pap op 5 deelen water) als de bloemtrosjes reeds zichtbaar, doch de bloempjes nog niet geopend zijn. De oudste blaadjes moeten ongeveer zoo groot zijn als een cent. De gevoelige soort Goliath spuiten met 1 deel pap op 7 deelen water.

Na de bespuiting treedt soms een lichte bladverbranding op, dit herstelt zich na korten tijd.

Bladluizen. Zie bij aalbessen.

Bladvalziekte. Zie bij aalbessen.

Kruisbessen

Amerikaansche kruisbessenmeeldauw. In 't voorjaar witte viltige plekken op de bessen, later worden de plekken bruin. Jonge scheuten worden later ook met de witte viltlaag bedekt.

Een voorjaarsbespuiting als de bessen ongeveer de grootte van een erwt hebben (ongeveer eerste helft van Mei), met alcalische

Bourgondische pap ($1\frac{1}{2}$ kg kopersulfaat $+1\frac{1}{2}$ kg sodex op 100 ltr water) houdt de bessen vrij van meeldauw; de bessen (vooral van de onderste druiptakken) moeten goed geraakt worden.

Door de bespuiting met alc. Bourgondische pap worden tevens de tijdens het spuiten aanwezige bastaardrupsen gedood. De eerste bespuiting met een maagvergif kan dan vervallen, wat met het oog op den groenen pluk wel van belang is.

Roode kruisbessenmijt. De jonge mijten beginnen direct aan de bovenzijde der eerste blaadjes te zuigen, waardoor grauwe vlekjes ontstaan; vaak is het aantal vlekjes zoo groot, dat het heele blad grauw gekleurd wordt en het lijkt of de struiken door loodglans aangetast zijn. Het aangetaste blad blijft klein en valt spoedig af.

Vroeg in het voorjaar, korten tijd voor het uitloopen der struiken, spuiten met $7\frac{1}{2}$% carbolineum, ook het hart der struiken goed raken.

Voor andere ziekten zie bij aalbessen.

Bessenbladwesp. Zie bij aalbessen.

Framboos

Spruitvreter (roode vorm). Knoppen en jonge scheutjes worden door roode rupsjes, die in een wit coconnetje den winter doorgebracht hebben, uitgevreten.

Winterbehandeling (Febr.) met $7\frac{1}{2}$% carbolineum. De vloeistof moet langs den stengel in den grond afloopen, om de aan den voet der stengels overwinterende rupsjes te dooden.

Frambozenkever. Kleine grijze kevertjes beschadigen de nog niet uitgekomen bloemknoppen. De larfjes (de bekende wormpjes) vreten in de vruchten. Eenige keeren, telkens na een week, spuiten met 1 deel nicotine $^{95}/_{98}$% in 1000 deelen water, nog beter in 1% zeepsop. De bespuitingen moeten 's morgens vroeg uitgevoerd worden, vooral de bloemknoppen goed raken.

Ziekte van den stengel. Aangetaste scheuten sterven af; soms opzwellingen, die later barsten, aan den voet; hierin dikwijls rose zwamkussentjes; dit is echter geen regel.

Winterbespuiting met $7\frac{1}{2}$% carbolineum.

Voorjaarsbespuiting met $1\frac{1}{2}$% Bordeauxsche pap, later met 1% herhalen.

Druif

Valsche meeldauw. Wit schimmelpluis aan de onderzijde der bladeren, meestal op plekjes langs de nerven, bladeren op die plekken roodbruin, verschrompelen spoedig en vallen af. Jonge

twijgen en vruchten worden aangetast, bessen worden loodgrijs en leerachtig.

Zoodra de ziekte, die zich bij ons wel buiten, doch niet in kassen vertoont, spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

Dopluis. Takken bezet met notedopvormige dopjes, waaronder in Juni de eitjes, welke met een wasdradenmassa omgeven zijn. De witte wasmassa komt later van onder de schilden te voorschijn.

Winterbehandeling met 7½% carbolineum.

Spint. De mijten bevinden zich aan de onderzijde der bladeren, welke grijsachtig bruin worden en verschrompelen.

Winterbehandeling 7½% vruchtboomencarbolineum, waaraan een petroleumpreparaat toegevoegd is (in den handel verkrijgbaar).

Zomerbehandeling, als bij perzik. Na het krenten kan Volck niet meer gebruikt worden. (Zie ook appel).

BOOMKWEEKERIJGEWASSEN

Rozen

Meeldauw, „het wit". Bladeren, scheuten, bloemstelen en knoppen worden met een fijn wit zwamweefsel bedekt, bladeren krullen, verdorren en vallen spoedig af.

Bij het eerste optreden spuiten met Californische pap (1 deel pap op 40 deelen water) of met 0.1% salicylzuur opgelost in zeepspiritus (10 gr salicylzuur oplossen in $^1/_{10}$ liter spiritus. Dit mengsel voegen bij 10 liter water, waarin 2 ons zeep is opgelost). De oplossing van salicylzuur in spiritus liefst eenigen tijd van te voren klaar maken. Het salicylzuur lost niet zoo spoedig op.

Valsche meeldauw ('t „zwart"). Op de bladeren kleine, blauwroode vlekken. Het aangetaste blad valt zeer spoedig af.

Zoodra men de vlekken begint waar te nemen, spuiten met 1% Bordeauxsche pap. Kassen zoo licht en luchtig mogelijk bouwen.

Sterroetdauw. Van uit één punt groeit de zwam eenigszins stervormig onder de opperhuid door, waardoor typische stervormige zwarte vlekken ontstaan. Aangetast blad valt vroegtijdig af. Ook jonge takken kunnen aangetast worden.

In het voorjaar, kort na het uitloopen, spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

Bladluizen. Door het zuigen der luizen krullen de bladeren. Aangetaste bladeren vallen spoedig af. Op den honingdauw, de kleverige afscheidingsproducten, welke de bladeren bedekken, ontwikkelt zich een zwarte zwam (roetdauw).

Winterbespuiting met 7½% carbolineum, in kassen 5% gebruiken.

's Zomers spuiten met zeepspiritusoplossing (1 liter spiritus en 2 kg zeep op 100 liter water) of nicotine preparaten.

Spint. Mijten aan de onderzijde der bladeren. Eitjes en larvenhuidjes bedekt met glanzend spinsel. Bladeren worden grauw en verschrompelen. Winterbehandeling met 7½% carbolineum, waaraan toegevoegd petroleumpreparaten. In kassen vóór het stoken en na het schoonmaken der struiken 5% carbolineum.

Bij het begin van de aantasting gelukt het wel door flink en krachtig met schoon water te spuiten (vooral de onderzijde der bladeren goed raken) de beschadiging tot staan te brengen.

's Zomers spuiten met 0.4% zwavellever (40 gr zwavellever op 10 liter water) en tarwebloempap; (zie vlugschr. 36), 2% Californische pap of 1% Volck.

Rozenbladwesp. In de toppen der jonge scheutjes leggen de bladwespen (gele vlieg) de eitjes in rijen; de beschadigde scheut groeit krom. De larven vreten aan de bladeren van den rand af, alleen de hoofdnerven blijven over.

Zoodra vreterij waargenomen wordt, spuiten met 0.1% Parijsch groen of 0.3% poedervormig loodarsenaat. Om bezoedeling der planten te voorkomen, wordt het loodarsenaat, dat voor kasculturen boven Parijsch groen de voorkeur verdient, aan een 1% zeepoplossing in plaats van aan 1% kalkmelk toegevoegd. De larven kunnen ook met contactgiften (zeepspiritus, nicotinepreparaten) gedood worden.

Slakvormige bastaardrups. Eind Mei legt de zwarte bladwesp de eitjes aan rozenbladeren. Larven groenachtig, lichaam van voren breeder dan van achteren (dolfijntjes), geen slijmomhulling. Zoodra de larven zich vertoonen spuiten met een contactgif (zeepspiritus, nicotinepreparaten) of maaggif (0.1% Parijsch groen of 0.3% poedervormig loodarsenaat).

Alle vretende insecten. Zoodra men vreterij begint waar te nemen spuiten met 0.1% Parijsch groen of 0.3% loodarsenaat in 1% kalkmelk.

Rozencicade. De bladeren worden bezet met witte stipjes, die in zeer groot aantal kunnen optreden, zoodat het bladgroen bijna geheel verdwijnt.

Bestrijding door bespuiting in het begin van den zomer met zeepspiritusoplossing. Vooral de onderzijde der bladeren goed raken.

Sierheesters

Bladluizen. Op tal van sierheesters (jasmijn, sneeuwbal e.a.) kunnen bladluizen voorkomen.

Door de aantasting vermindert de groei, de bloei gaat soms geheel verloren (sneeuwbal), de bladeren worden soms gekroesd en de jonge scheuten misvormd.

In den zomer kan een bespuiting met zeepspiritus (2 kg zeep + 1 liter spiritus op 100 liter water) resultaat geven.

Een winterbespuiting met 7½% carbolineum is in vele gevallen nog beter.

Skimmia en Genista verdragen slechts een 5% oplossing.

Dopluizen. Verschillende koude kasplanten en ook struiken buiten kunnen sterk door dopluizen aangetast zijn. Door een winterbespuiting met 7½% vruchtboomcarbolineum worden de eitjes gedood. Enkele gewassen (Camellia, Citrus) bespuite men met 5% inplaats van met 7½%.

Vretende insecten. Bij de eerste beschadiging spuiten met 0.1% Parijsch- of Uraniagroen of 0.3% poedervormig loodarsenaat in 1% kalkmelk.

Buxus

Bladvloo. Door de aantasting zijn de blaadjes bobbelig en naar binnen gebogen, scheutjes zijn gedrongen; de larven overwinteren onder een witte dradenmassa tusschen knopschubben.

Winterbespuiting met 7½% carbolineum.

Dop- en Schildluis. Winterbespuiting met 7½% carbolineum.

Rhododendron

Rhodowants (Japansche vlieg). In den nazomer legt het wijfje de eitjes in het bladweefsel aan de onderzijde van het blad, meestal langs de hoofdnerf. In Mei verschijnen de larven, die sappen uit het blad zuigen. Het blad krijgt een geelwitte kleur. De onderzijde der bladeren is vuil bruin gekleurd.

Bespuiting met zeepspiritus en nicotinepreparaten geeft goede resultaten (onderzijde der bladeren raken), mits dikwijls gespoten wordt.

Bladvlekkenziekte (Gloeosporium rhododendri). Bladeren van verschillende soorten worden aangetast. Ook komen de vlekken vaak voor op zaailingen, die voor zetstammetjes bestemd zijn.

In 't voorjaar spuiten met 1% Bordeauxsche pap.

Snuitkever (*Otiorrhynchus*). Vanaf den bladrand vreet de kever

onregelmatige stukken uit het blad. De larven, welke in den grond leven, zijn ook zeer schadelijk, doordat ze aan de wortels vreten.

Zoodra de bladbeschadiging wordt waargenomen, spuiten met 0.1% Parijsch groen of 0.3% poedervormig loodarsenaat.

Azalea indica

Azaleamotje (Gracilaria azaleëlla). De zeer kleine, lichtgroene rupsjes met donkeren kop leven inwendig in de bladeren. Er zijn verschillende generaties per jaar.

Herhaalde bespuitingen met sterke nicotine (1:500) of met pyrethrumpreparaten.

Azalea (bladverliezende en Japansche)

Spint (Phyllocoptes azaleae). Bladeren krijgen omgekrulde randen, ontwikkelen zich niet, worden bruin. Scheuten groeien niet uit.

Spuiten in Febr. met 7½% carbolineum.

's Zomers spuiten met 2% Californische pap of met 0.4% zwavellever + tarwebloempap. (Zie vlugschr. 36)

Snuitkever. Zie bij Rhododendron.

Wilgen

Wilgenhaantjes. Zoowel larven als kevers zijn schadelijk. De eersten skeletteeren het blad, de laatsten vreten gaten in het blad en beschadigen den bast van de twijgen. In grienden is de schade zeer aanzienlijk.

Zoodra de kevers worden waargenomen, spuiten met 0.1% Parijsch groen, vooral de onderste takken en daar in 't bijzonder de onderzijde van de bladeren flink raken. Bij wilgen met behaarde bladeren echter weinig resultaat.

Appelzaailingen

Meeldauw. De groei van appelzaailingen wordt soms sterk belemmerd door de aantasting van meeldauw. Het witte mycelium bedekt de bladeren en overtrekt het lot.

Een bespuiting met Californische pap 1:40 of 1% Solbar geeft goede resultaten.

Schurft. Bladeren vertoonen onregelmatige vlekken, die met groenachtig schimmelpluis bedekt zijn. In het voorjaar spuiten

met 1% Bordeauxsche pap, daarna eenige keeren met Californische pap 1: 40.

Spint. De blaadjes krijgen een grijze tint. Mijten hoofdzakelijk aan de onderzijde van het blad.

Spuiten met zwavelleveroplossing (0.4% = 4 gr per liter water) of Volck 1%.

Perezaalingen

Bladvlekkenziekte (Entomosporium maculatum). Op de bladeren ontstaan plotseling kleine grijze tot bruine, hoekige vlekjes, die zeer snel in aantal toenemen. Spoedige bladafval.

Dadelijk bij het optreden der vlekjes spuiten met 1½% Bordeauxsche pap en dit om de twee weken herhalen.

Cytisuszaalingen

Ceratophorum setosum. Deze zwam veroorzaakt bruine vlekjes op de bladeren en scheuten van Cytisuszaailingen.

Voorjaarsbespuiting met Bordeauxsche pap 1½%.

Coniferen

Spint. Door aantasting door mijten worden de naalden grauw en vallen af. Winterbespuiting met 7½% carbolineum.

Alleen enkele Juniperussoorten (Jun. elegantissima) kunnen deze bespuiting niet verdragen. Blauwe sparren verdragen haar zeer goed.

Luizen. Op coniferen leven zeer verschillende soorten luizen. Sommige veroorzaken roodachtige gallen aan de takken, anderen doen de knoppen galachtig opzwellen. Ook naalden worden door de luizen beschadigd.

Winterbespuiting (Febr.-Maart) met 7½% carbolineum.

's Zomers kan een bespuiting met zeepspiritus toegepast worden. Blauwsparren zijn gevoelig voor zeepspiritus, de waslaag wordt aangetast.

Dopluis. Op verschillende Thuya-soorten komt een dopluissoort voor. Winterbehandeling met 7½% carbolineum geeft uitstekende resultaten.

Taxus

Rondknop. De door mijten aangetaste knoppen loopen niet uit, doch verdikken zich abnormaal en sterven vrij spoedig af.

Een bespuiting met carbolineum 7½% (Dec.-Jan.) geeft goede resultaten.

Dopluis. Kleine schildpadvormige dopjes komen op de takken voor. Gedurende den zomer bevinden zich onder de dopjes een groot aantal eitjes, gehuld in een witte wollige massa, welke van onder de dopjes te voorschijn komt. 's Winters spuiten met 7½% carbolineum.

BLOEMGEWASSEN

Viola tricolor (zaadteelt)

Bladvlekkenziekte (Ramularia). Op de bladeren verschijnen vlekken, waardoor de groei der planten geheel ophoudt. Spuiten met 2% Bourgondische pap of 1% Bordeauxsche pap 4 maal, vanaf begin Juli, met tusschenruimten van 2 weken.

Anjelieren

Roest. Chocoladekleurige sporenhoopjes op de bladeren, soms ook op de stengels. Bij het allereerste optreden der ziekte bespuiten met 1% Bordeauxsche pap.

Bladvlekkenziekte. Op de bladeren komen kleine grijze vlekjes voor. Een behandeling met 1% Bordeauxsche pap of met 0.4% zwavelleveroplossing wordt aanbevolen.

„Het zwart." (Heterosporium echinulatum). Op bladeren en stengels ontstaan ronde, witte vlekjes, welke later van het midden uit zwart worden, uitgezonderd de wit blijvende rand. De aantasting kan, vooral in kassen, zeer ernstig zijn.

Een tijdige bespuiting met 1% Bordeauxsche pap verdient aanbeveling.

Spint. Bladeren worden grijs. Aan de onderzijde der bladeren bevinden zich de mijten. Bij het eerste optreden spuiten met 0.4% zwavellever vermengd met tarwebloempap, nicotinepreparaten of 1% Volck.

Hyacinth en Narcis

Het vuur. De bladeren krijgen gele toppen, welke in rotting overgaan. Deze rotting zet zich snel naar onderen toe voort.

Spuiten met 1½% Bordeauxsche pap.

Tulp

Tulpen verdragen Bordeauxsche pap niet, zoodat dit middel tegen het vuur in dit gewas *niet* aangewend kan worden.

GROENTEN

Kool

Valsche meeldauw. Jonge koolplanten vertoonen geelwitte vlekken op de bladeren. Aan de onderzijde van de vlekken ontstaat een wit schimmelpluis. Bij vochtig warm weer kan de ziekte zich sterk uitbreiden, de planten gaan dan spoedig in rotting over.

Bij het eerste optreden van de ziekte spuiten met 1% Bordeauxsche pap, waaraan 1% harszeep is toegevoegd om de kleefkracht te verhoogen. Eenige malen licht spuiten.

Aardvlooien. Jonge planten worden sterk beschadigd, kleine gaatjes in de bladeren. Van kiemplantjes worden zaadlobben en stengeltop geheel opgevreten. Bij droog schraal weer kan de schade zeer groot zijn.

Zoodra vreterij wordt waargenomen, spuiten met 0.1% Parijsch- of Uraniagroen of met 0.3% poedervormig loodarsenaat.

Bespuitingen met nicotinepreparaten (1 deel zuivere nicotine op 1000 deelen water). Liefst bij zonnig weer spuiten.

Draaihartigheid. Door het zuigen van larfjes van galmugjes in de oksels der bladeren ontstaat een abnormale groei. De bladeren draaien om de lengte-as van den stengel.

Door een veertiendaagsche bespuiting met zeepspiritus of nicotinepreparaten kunnen goede resultaten verkregen worden.

Tomaat

Bladvlekkenziekte (zgn. meeldauw). Op de bladeren ontstaan geelbruine vlekken, de ziekte begint bij de onderste bladeren, later worden ook de andere aangetast. Aan de onderzijde van de vlekken vormt zich een bruin zwamweefsel. Sterk aangetaste planten sterven vroeg af en geven weinig vruchten.

Vroegtijdig begonnen en herhaalde bespuitingen met Californische pap 1 op 40 water (bij zonneschijn 1 op 60) kunnen goede resultaten geven (ook onderzijde goed raken).

Komkommer en meloen

Spint. Bladeren eerst bedekt met kleine gele vlekken, spoedig wordt het heele blad grauwgeel, dan droogt het blad uit, het wordt hard en stijf, randen krullen om.

De mijten leven aan de onderzijde van de bladeren, daar is het bladoppervlak met een zeer fijn spinsel overtrokken, waartusschen eitjes en larvenhuidjes blijven hangen (meelachtig uiterlijk).

Spuiten met 0.4% zwavelleveroplossing en tarwebloempap

(zie vl. 36) of met nicotinepreparaten (tabakaftreksel, nicotinesulfaat, X.L. All.). Vooral onderzijde goed raken. 1% Volck geeft ook goede resultaten.

Erwten

Bladrandkever. De kevers vreten vanaf den bladrand regelmatige stukjes uit den bladschijf, zoodat het blad een gekartelden rand krijgt. Bij schraal weer kan de schade aanzienlijk zijn.

Jonge planten kunnen bespoten worden met 0.1% Parijsch groen. Zoodra er vruchten (peulen) gevormd zijn, mag met dit vergif niet meer gespoten worden.

Spint. Door de aantasting der mijten ontstaan zgn. „spinterige" bladeren. De groei van de planten kan bij droog weer geheel ophouden, het blad verdroogt. Aan bestrijding wordt nog weinig gedaan. Bespuitingen als bij komkommer.

Boonen

Bladluizen. Vooral in „groote boonen" (tuinboonen) kunnen de bladluizen schadelijk zijn. De zwarte luizen zitten bij voorkeur in de toppen. Zij vermeerderen zich sterk, zoodat in korten tijd een groot deel van het gewas aangetast is. De toppen groeien niet meer uit, de schokken groeien krom en bevatten weinig zaden.

Een bespuiting met 2% zeep + 1½% spiritus kan toegepast worden. Ook nicotinepreparaten geven goede resultaten. Bespuiten, zoodra men de eerste luizen ziet.

Uien

Valsche meeldauw. Aan den top van het blad bruingele en witte vlekken, waarop, vooral bij vochtig weer een grauwwit schimmelpluis ontstaat, later gevolgd door een zwart; aangetaste plekken gaan spoedig in rotting over.

Bij zaadplanten wordt de bloemstengel aangetast, die daar op de rotte plek omknikt.

Bij het eerste optreden van de ziekte onmiddellijk spuiten met 1 à 2% Bordeauxsche pap. Eenige keeren kort na elkaar zeer licht spuiten, daar anders de vloeistof van de gladde bladeren afstroomt. Toevoeging van 1% harszeep bevordert de kleefkracht.

LANDBOUWGEWASSEN

Aardappel

De aardappelziekte. Bladeren krijgen bruingrijze vlekken, welke zich bij vochtig warm weer snel uitbreiden, in enkele dagen kunnen de planten geheel afgestorven zijn.

Bespuiten met 1½ à 2% Bordeauxsche pap of met ± 2½% Bourgondische pap. De eerste maal kort voor of bij het uitbreken der ziekte, daarna nog eenige keeren al naar de omstandigheden dit noodig maken. Door het Kon. Meteorologische Instituut te de Bilt wordt per radio bekend gemaakt, wanneer de factoren voor het optreden of voor uitbreiding van de ziekte gunstig zijn.

Het is noodig meer dan één bespuiting uit te voeren, daar anders de kans bestaat, dat de knollen meer aangetast worden dan zonder bespuiting.

Bieten

Aaskever. Jonge bietenplantjes worden soms geheel afgevreten door de vrij platte, grauw gekleurde larven van aaskevers.

Een onmiddellijke bespuiting met 0.1% Parijsch groen geeft baat.

Schildpadtorretje. Betrekkelijk kleine, langwerpige, geelgroene larven vreten groote gedeelten van het blad op. In sommige jaren is de schade bijzonder groot. De kevertjes zijn bruin, vrij plat; de dekschilden steken met een platte rand buiten het lichaam uit.

Bij de eerste beschadiging, die soms al bij de kiemplanten — en dan ernstig — optreedt, onmiddellijk spuiten met 0.1% Parijsch groen (meldeplanten zooveel mogelijk verwijderen).

Valsche meeldauw (langzaam verloopend hartrot). Vooral de hartbladeren worden aangetast, deze bladeren vertoonen bleekgroene, eenigszins gewelfde plekken, aan de onderzijde daarvan grauw schimmelpluis, bladeren rotten weg, later ook de top van de biet.

Ook zaadstengels kunnen aangetast worden, dan lijdt de zaadvorming daar sterk onder.

Bij het eerste optreden spuiten met 1½% Bordeauxsche pap, waaraan 1% harszeep is toegevoegd om kleefkracht te bevorderen.

Koolzaad

Glanskever. Glimmend groenzwarte kevers en geelachtig witte larven vreten aan en in de bloemen van kruisbloemige gewassen. Eenige bespuitingen met een maagvergif of met nicotine 1: 1000

in 1% zeepwater. 's Morgens vroeg spuiten, eerste bespuiting bij het opengaan der eerste bloemen. Met het oog op de bijenvergiftiging mag tijdens den bloei niet met een maagvergif gespoten worden.

Aardvlooien. Kevers beschadigen de bladeren en onrijpe hauwen, larven maken gangen in bladstelen en zaadstengels. In het voorjaar eenige keeren spuiten met nicotine 1 : 1000 in 1% zeepwater

Erwten

Bladrandkever. Zie bij groenten.

Vlas

Aardvlooien. Vooral de overwinterde kevers beschadigen in een droog schraal voorjaar de jonge vlasplanten sterk. Zoodra beschadiging optreedt spuiten met nicotine 1 : 1000 in 1% zeepwater. Bespuiting één of tweemaal.

Onkruidbestrijding in granen

Herik. Dit onkruid kan in zulke groote hoeveelheden op de akkers voorkomen, dat het gewas er door verstikt wordt; tevens kunnen op dit onkruid tal van ziekten voorkomen, welke later het geteelde gewas besmetten. Vernietigen van dit onkruid is dus zeer gewenscht. Dit kan verkregen worden door bespuiting met ijzervitriool (20%). Voor deze bespuiting wordt van de paardensproeimachine gebruik gemaakt. Ook oplossingen van zwavelzure ammoniak hebben bij proeven goede resultaten gegeven. [1])

II. SPROEIMIDDELEN

In verband met hun werking onderscheiden we twee groepen van middelen:

1°. die, welke dienen ter bestrijding van dierlijke parasieten (insecticiden).

2°. die, welke gebruikt worden tegen ziekten, veroorzaakt door zwammen (fungiciden).

Deze laatsten hebben meestal een voorbehoedende werking. De echte zwammen, welke voor plantenziekten de meeste be-

---

[1]) Overigens kan men ook zonder spuiten door bestrooiïng met fijngemalen kaïniet de herik afdoend bestrijden. Deze mededeeling bespreekt echter alleen *sproei*-middelen.

teekenis hebben, bezitten een uitgebreid netwerk van fijne draden (mycelium). Dit mycelium leeft inwendig in de planten; alleen bij de meeldauwzwammen leeft het uitwendig op de planten.

De zwammen planten zich voort door sporen, uiterst fijne organen, die, wanneer ze op een plant terecht komen, onder gunstige omstandigheden gaan kiemen en daarbij een kiembuis vormen, die in het plantenweefsel binnendringt, waar het zich verder tot mycelium ontwikkelt.

De meeste fungiciden hebben ten doel de kiemen der sporen te dooden (koperverbindingen).

Bij de meeldauwzwammen, „wit" op perzik, appel, Amerikaansche kruisbessenmeeldauw e.a., leeft het mycelium buiten op de plantendeelen, (bladeren, scheuten, vruchten). Dit uitwendige mycelium kan gedood en verdere ontwikkeling tegengegaan worden zonder de plant te beschadigen, (zwavelpreparaten, Bordeauxsche pap).

De groep van insecticiden verdeelt men naar de wijze waarop zij de dierlijke parasieten dooden, in drie ondergroepen.

a. Contactgiften, die de diertjes of de eieren dooden, als zij er mee in aanraking komen (carbolineum, spiritus).

b. Maagvergiften, waardoor de diertjes gedood worden als zij ze met het voedsel in de maag opnemen.

c. Ademhalings- en zenuwvergiften. Deze dringen in de ademhalingsbuizen of prikkelen de zenuwen zóó, dat de dood van de diertjes er het gevolg van is.

Door te spuiten met mengsels van fungiciden en insecticiden — verschillende mengsels zijn in den handel verkrijgbaar, ook kunnen zij zelf gemaakt worden — kan men tegelijkertijd zwamziekten en dierlijke parasieten bestrijden.

INSECTICIDEN

Contactgiften

Het belangrijkste middel uit deze groep is carbolineum.

Het gebruik hiervan is de laatste jaren zeer sterk toegenomen. Carbolineum is een mengsel van verschillende stoffen, die als bijproducten bij de gasfabricatie gewonnen worden. Met zekerheid kan nog niet aangegeven worden, welke insecticide werking de verschillende bestanddeelen uitoefenen, ofschoon er wel aanwijzingen zijn, dat de teeroliën, welke bij hooge temperatuur overdestilleeren, het werkzaamst zijn.

Ongeprepareerd carbolineum wordt voor bespuitingen niet meer gebruikt. De voordeelen aan een fabriekmatige prepareering

(emulgeering) verbonden, nl. gelijkmatige vermenging met water in de gewenschte verhouding en verdeeling in zeer kleine deeltjes-zijn zoo groot, dat het product den hoogeren prijs, die voor het geprepareerde (= geëmulgeerde = oplosbare) carbolineum betaald moet worden, geheel waard is.

Goed carbolineum moet zich uiterst fijn in water verdeelen. De zgn. oplossing (emulsie) moet een melkwitte of licht chocoladekleurige vloeistof vormen, waarin geen of hoogstens slechts enkele bruine druppeltjes mogen voorkomen. Komen deze in grooter getale voor, dan mag er niet mee gespoten worden.

Er mag, als de vloeistof eenigen tijd blijft staan, ook geen bezinksel afgezet worden.

De fout kan liggen in het carbolineum zelf. Als men echter de vertrouwde merken, die op grond van jarenlange ervaring vervaardigd worden, gebruikt, behoeft men voor ondeugdelijkheid niet te vreezen.

Ongeschikte oplossingen ontstaan met brak of met hard water. Toch schijnt brak water nog bruikbaar te zijn, als eerst met zoet water een verdunning gemaakt wordt. Volgens sommige waarnemingen kan dan later met brak water bijgevuld worden.

Door toevoeging van een 10% soda-oplossing kan ook hard water bruikbaar gemaakt worden.

Men mag carbolineum niet eerst met een kleine hoeveelheid water vermengen met de bedoeling er later de groote hoeveelheid water bij te voegen. In het mengsel van carbolineum met weinig water hebben omzettingen plaats, waardoor het carbolineum onoplosbaar wordt. De carbolineum moet dus bij de benoodigde hoeveelheid water gevoegd worden.

Vroeger gebeurde het wel, dat zich uit carbolineum, als het eenigen tijd, vooral tijdens vorst, bewaard was, een zandachtige massa (naphtaline) afgezet had.

Tegenwoordig worden de goede producten, voordat zij afgeleverd worden, uitgevroren. Het „zandige" bezinksel mag dus niet meer voorkomen.

Voor winterbespuitingen gebruikt men algemeen 7½%.

Perziken, welke eenigszins gevoelig zijn, verdragen niet meer dan 5%. Om tegen bloedluis bij appel resultaten te verkrijgen moet minstens met 10% gespoten worden.

Door de winterbespuiting doodt men de diertjes (ook de eieren) welke op takken en stammen overwinteren.

Carbolineum is daardoor een bestrijdingsmiddel tegen bladluizen, schildluizen, dopluizen, spruitvreter van bessen en frambozen, wintervlinder, bladvlooien, ook eenigszins tegen wantsen, spint en bloedluis.

Door een bijzondere bereiding kan een bijzonder soort carbolineum verkregen worden, dat tegen wantsen krachtiger werkzaam is. Voor de bestrijding van wantsen dient men dit bijzondere product te gebruiken.

De werking tegen spint kan verhoogd worden door aan het carbolineum petroleumpreparaten toe te voegen. Dergelijke mengsels zijn in den handel verkrijgbaar.

Ofschoon carbolineum een insecticide is, geeft het in sommige gevallen ook baat tegen monilia van de pruim, tegen kanker bij appels en peren en tegen meeldauw bij kruisbessen.

Carbolineum doodt verder den groenen aanslag, (bestaande uit mossen, wieren en korstmossen), welke vaak op stammen en takken te vinden is. Het gevolg van de bespuiting is dan ook, dat de stammen mooi glad en glanzend worden. In vele gevallen bevordert carbolineum den groei van de gewassen.

Er zijn aanwijzigingen, dat een vroege bespuiting de eerste ontwikkeling vervroegt, een late bespuiting deze vertraagt. Men meent van deze vertragende werking te kunnen gebruik maken om gevoelige gewassen (krozen, zwarte bessen) tegen nachtvorst te beschermen. Door deze gewassen laat te bespuiten zou de bloei pas plaats vinden in een periode, waarin van nachtvorsten niet veel meer te vreezen is.

Carbolineum kan ook dienst doen bij het schoonmaken (ontsmetten) van kassen en bakken. Eenige voorzichtigheid moet daarbij in acht genomen worden; tomaten, komkommers en meloenen en rozen zijn zeer gevoelig gebleken, zoodat ze in kassen, welke met carbolineum schoongemaakt waren, ook vrij langen tijd na de behandeling, niet meer wilden groeien of een uiterst kwijnend bestaan hadden. Andere gewassen zijn minder gevoelig, toch moet het schoonmaken een behoorlijken tijd voordat geplant wordt of voordat men de ramen gaat gebruiken, plaats hebben.

Zwavellever. Ruwe zwavellever (zwavelkalium) is voor bespuitingsdoeleinden geschikt. Men lost de brokken op in water. Voor 100 liter water is 4 ons zwavellever noodig, men spuit dus met 0.4% oplossing. De oplossing kan niet bewaard worden.

Het middel is zeer werkzaam tegen spint, terwijl ook andere zachthuidige insecten er mee bestreden kunnen worden.

Toevoeging van tarwebloempap verhoogt de werking. Meet één liter water af en maak met een weinig daarvan met 50 gr ($\frac{1}{2}$ ons) tarwebloem een zachte brij, voeg dan al roerende de rest van de liter water toe, zoodat een melkachtige vloeistof ontstaat. Kook deze vloeistof onder voortdurend roeren tot het schuimt. De hoeveelheid tarwebloempap, die men op die wijze verkrijgt, is voldoende voor 10 liter zwavelleveroplossing.

Californische pap. Dit middel, dat vooral als fungicide gebruikt wordt, heeft ook een insecticide werking. Het wordt gebruikt in een verdunning met water van 1 : 5 tegen de pokziekte bij peren en tegen rondknop op zwarte bessen en in een verdunning met water van 1 : 40 tegen spint.

Zeepspiritus. Dit is vrijwel het goedkoopste en toch zeer bruikbare middel tegen diertjes met een weeke, zachte huid, zooals bladluizen. Door aanraking met deze vloeistof worden de meeste van deze insecten gedood. Het is echter vaak moeilijk hen te raken, als ze verscholen zitten in de sterk gekrulde bladeren.

Jonge schildluizen, die als kleine witte stipjes in het voorjaar op aangetaste boomen zichtbaar zijn, kunnen ook door een zeepspiritusbespuiting gedood worden.

Bloedluis is zoo goed beschermd door de wasachtige massa, dat ze door een bespuiting niet gemakkelijk gedood wordt.

Aanstippen met een harde borstel of kwast geeft dan ook beter resultaat. Meestal wordt daarvoor een sterkere oplossing gebruikt dan tegen bladluizen.

De zeepspiritusoplossing wordt gemaakt door 1 liter brandspiritus toe te voegen aan 100 liter water, waarin 2 kg zachte zeep is opgelost.

Nicotine praeparaten. Het eenvoudigste is een aftreksel van goedkoope tabak of tabaksstelen. Men neemt van 3 tot 5 pond per 50 liter water; eerst de tabak op 10 liter water 24 uur op een warme plaats laten trekken.

Met meer zekerheid kan men gebruik maken van de preparaten, welke door verschillende fabrikanten in den handel gebracht worden. De verschillende preparaten hebben niet alle hetzelfde nicotine-gehalte. Daardoor moet men van het eene product een sterkere oplossing gebruiken dan van het andere. De sproeivloeistof moet op 1000 à 1500 deelen water 1 deel zuivere nicotine bevatten. Het best voldoen de hoogprocentige (95—98%) nicotine preparaten. Hiervan heeft men per liter water 1gr = 1 cm^3 noodig.

De gebruiksaanwijzing, welke op de verpakking staat aangegeven, kan gevolgd worden.

Met nicotinepreparaten doodt men bladluizen, spint, thrips, frambozenkevers, aardvlooien, e.a. Vrij gevoelige kasplanten kunnen er nog mee behandeld worden, alleen bij Adiantums moet men voorzichtig zijn.

Nicotine kan toegevoegd worden aan Bordeauxsche pap, Californische pap, zeepspiritus en maagvergiften.

Phytophiline. Een geheim middel, waarvan de samenstelling niet met zekerheid bekend is. Het kan met goed gevolg gebruikt

worden, waar nicotinepreparaten ook baat kunnen geven. De prijs is vrij hoog.

X.L.All. Dit Engelsche preparaat, ofschoon vrij duur, wordt op verschillende kweekerijen wel gebruikt om bladluizen, spint, thrips e.a. te dooden. Het is als vloeistof en als pasta in den handel.

Volck. Dit is een witte, uit petroleum bereide pasta. Men gebruikt een 1% oplossing tegen spint, bladluizen e.a. Tegen wolluis moet men een sterkere oplossing (4%) gebruiken.

Zesopea. Dit middel, dat op het vorige gelijkt, kan men zelf bereiden met **Ze**ep, **So**da en **Pe**troleum. Om de sproeivloeistof te maken, roert men 2 ons zachte zeep met 1 ons fijne soda goed dooreen, tot een homogene massa ontstaat, daaraan voegt men, onder voortdurend roeren, druppelsgewijs 100 cm^3 petroleum toe. De zalvige massa, die men dan verkrijgt, wordt, ook onder roeren bij 10 liter water gevoegd. De pasta kan niet bewaard worden.

Andere middelen. Er zijn verschillende Duitsche preparaten in den handel gekomen, o.a. Limitol en Ustin tegen bloedluis, Exodin, Venetan, Aphidon en Dekalit tegen bladluizen. Zij zijn wel werkzaam, doch duur en worden daarom alleen in bijzondere gevallen gebruikt.

Maagvergiften

Hiervoor gebruikt men hoofdzakelijk arsenicumverbindingen. Zij kunnen slechts gebruikt worden tegen vretende insecten alsook tegen thrips. Insecten met enkel zuigende monddeelen, zooals bladluizen, worden er niet door gedood.

De arsenicumpreparaten gebruikt men in 1% kalkmelk (10 gr drooggebluschte kalk per liter water). Zonder bijvoeging van kalk bestaat er kans op bladverbranding, welke door vrij arsenigzuur veroorzaakt wordt. Arsenicumpreparaten mogen niet meer verspoten worden op plantendeelen, die binnen een maand na de behandeling genuttigd worden.

Als men bij het afwegen van kleine hoeveelheden niet over kleine gewichten beschikt, kan men van geldstukken gebruik maken. Mits niet te veel afgesleten weegt een rijksdaalder 25 gr; een gulden 10 gr; een kwartje 2½ gr en een dubbeltje 1 gr.

Parijsch groen. Dit is een bekende groene verfstof, welke bij drogisten verkrijgbaar is. Men gebruikt 1 gr per liter kalkmelk. Deze geringe hoeveelheid is reeds voldoende om alle vretende insecten te dooden. Er behoeft zelfs niet zwaar gespoten te worden.

Parijsch groen lost niet op, maar blijft eenigszins zweven. Af

en toe flink schudden is noodig om het op den bodem zinken tegen te gaan.

Uraniagroen. Dit is vrijwel hetzelfde als Parijsch groen. Het wordt echter uitsluitend voor bestrijdingsdoeleinden in den handel gebracht. In verband met deze bestemming is het lichter en fijner, zoodat het in de vloeistof minder snel naar den bodem zinkt. Men gebruikt er ook 1 gr per liter vloeistof van.

Uraniagroen tabletten. Aangezien het afwegen van het poedervormige Parijsch groen, vooral omdat de benoodigde hoeveelheden zoo klein zijn, eenigszins bezwaarlijk is, heeft men het Uraniagroen in tabletvorm vervaardigd.

Elke tablet, voldoende voor 100 liter water, is in vijf reepen verdeeld, zoodat ook gemakkelijk de hoeveelheid voor kleinere hoeveelheden (20 liter, 10 liter,) afgemeten kan worden.

Doordat reeds een stof is toegevoegd, die het vrije arsenigzuur onschadelijk maakt, behoeft men ook geen kalk meer te gebruiken, doch kan men het blokje direct met wat water aanroeren tot een papje, dat dan met de rest van het water wordt vermengd.

Perziken blijken echter gevoeliger te zijn dan andere gewassen.

Voor dit gewas is toevoeging van kalkmelk raadzaam, daar anders nog verbranding optreedt. Beter nog is het perziken niet met bovenstaande middelen, doch met loodarsenaat te bespuiten.

Parijsch- en Uraniagroen kunnen alleen met Bordeauxsche pap, niet met Californische pap of met Bourgondische pap vermengd worden.

Loodarsenaat. Deze stof wordt gebruikt, als men bladverbranding (die bij Parijsch groen een enkele maal voorkomt) geheel wil voorkomen.

Van deze stof, dat als poeder en als pasta verhandeld wordt, gebruikt men 3 gr poeder en 5 gr pasta per liter kalkmelk.

Loodarsenaat kan vermengd worden met Bordeauxsche en met Californische pap, niet met Bourgondische pap.

Bariumchloride. Dit witte poeder is veel minder giftig dan de vorige middelen. Men gebruikt het alleen als een bespuiting met arsenicumpreparaten niet toegepast kan worden en een bespuiting toch noodzakelijk is. Dit geval kan zich voordoen tijdens den bloei van de vruchtboomen. Spuit men dan met arsenicumpreparaten, dan kan men groote schade aan de bijenvolken toebrengen.

Het bezwaar van bariumchloride is, dat het gemakkelijk afgespoeld wordt door regen. Dit bezwaar kan men ondervangen door *harszeep* toe te voegen. Deze stof zelf heeft als bestrijdingsmiddel geen waarde; zij is echter zeer nuttig om de kleefkracht te bevorderen.

Harszeep wordt gemaakt door 1 kg hars met $1\frac{1}{2}$ liter water aan de kook te brengen. Dan voegt men onder voortdurend roeren $\frac{1}{2}$ kg kaliumcarbonaat (potasch) toe. Onder heftig bruisen wordt de hars dan verzeept (de pan, waarin men de zeep klaar maakt, moet flink groot zijn).

Alle gebruikelijke sproeivloeistoffen kunnen met harszeep gemengd worden. Voor 100 liter sproeivloeistof heeft men 1 kg harszeep noodig.

Kalkmelk. Speciaal ter bestrijding van thrips worden planten wel bespoten met 2% kalkmelk. Er komt op de planten dan een laagje kalk, dat ze beschermt tegen de beschadigingen, welke thrips teweeg brengt.

Ademhalings- en zenuwvergiften

Als zoodanig kan men verschillende petroleum bevattende middelen beschouwen, b.v. Rids (Radicaal Insecten Doodende Straal), Abis (Afdoende Bestrijding Insecten Schade), Alio Spree, Flyosan, Flit en meer dergelijke middelen. Zij werken zeer goed tegen vliegen, muggen, motten in kamers, kelders en stallen. Voor insectenbestrijding op planten zijn zij minder geschikt.

Fungiciden

Bordeauxsche pap. Dit meest bekende en meest gebruikte bestrijdingsmiddel is bij toeval gevonden. Oorspronkelijk werd het in Frankrijk op druiven verspoten om diefstal tegen te gaan. De blauwe kleur der bespoten planten gaf den indruk, dat deze vergiftig waren. In 1882, toen de valsche meeldauw bijzonder hevig optrad, bleek, dat de bespoten druiven gezond bleven, terwijl de onbehandelde in korten tijd het blad lieten vallen. Daarna heeft men nauwkeurig den invloed van Bordeauxsche pap nagegaan en gevonden, dat deze pap tegen verschillende zwamziekten een uitstekend middel was.

Bordeauxsche pap wordt gemaakt uit kopervitriool en kalk. Tegenwoordig gebruikt men meestal een $1\frac{1}{2}$% of een 1% oplossing, daarvoor is resp. noodig $1\frac{1}{2}$ kg kopervitriool + 1 kg kalk en 1 kg kopervitriool + 0.7 kg kalk op 100 liter water.

Als men geen kluitkalk of droog gebluschte kalk ter beschikking heeft, kan men ook kalkbrij, zooals metselaars en stucadoors gebruiken, met water tot kalkmelk aanmengen. Men neemt dan $1\frac{1}{2}$ liter kalkbrij, voegt hieraan al roerende 50 liter water toe. Bij deze 50 liter kalkmelk voegt men dan 50 liter kopersulfaatoplossing.

De oplossing moet klaar gemaakt worden in houten vaten,

daar ijzer door kopervitriool aangetast wordt.

Meestal wordt 50 liter water, waarin $1\frac{1}{2}$ kg of 1 kg kopervitriool opgelost is, uitgegoten in een vat van 100 liter waarin zich 50 liter kalkmelk bevindt. Bij motorsproeimachines vult men het reservoir eerst met kalkmelk tot het op $\pm$ 50 liter na gevuld is. Dan spoelt men de benoodigde hoeveelheid kopersulfaat met 50 liter water door de zeef, ook maakt men wel een oplossing van het kopersulfaat met een kleine hoeveelheid water en voegt dit bij de kalkmelk. Er ontstaan dan licht-blauw gekleurde geleiachtige verbindingen, die in de vloeistof blijven zweven.

Bordeauxsche pap werkt voorbehoedend. Het doodt de jonge kiemdraad op het oogenblik, dat deze uit een zwamspore groeit en in het blad wil binnendringen. Men veronderstelt, dat de kiemdraad een eenigszins zuur vocht afscheidt, waardoor de koperverbindingen opgelost worden en dan de jonge kiem dooden.

Het gebruik van veel kalk, waartoe sommige kweekers wel neiging hebben, omdat zij meenen, dat de kleefkracht daardoor verhoogd wordt en omdat zij dan het spuitwerk beter kunnen controleeren, moet toch ontraden worden. De overmaat van kalk kan de Bordeauxsche pap minder werkzaam maken.

In Bordeauxsche pap hebben we een uitstekend middel tegen de schurftziekte van appel en peer. De eerste bespuiting met $1\frac{1}{2}$% moet plaats hebben als de bloemknoppen zich beginnen te vertoonen. De gemengde- en bladknoppen zijn dan reeds los.

Peren kunnen voor de tweede maal bespoten worden met 1% als de vruchtjes gezet zijn en zoo noodig een derde maal eenige weken daarna.

Appels verdragen een bespuiting met Bordeauxsche pap op de bladeren en vruchten niet goed. Voor de tweede en derde bespuiting gebruikt men daarom Californische pap (1 op 40). Ook voor de tweede en derde bespuiting bij peren begint het gebruik van Californische pap toe te nemen. Bij het gebruik van dit middel kleuren de vruchten zich mooier. Bordeauxsche pap maakt soms de schil eenigszins ruw.

Bordeauxsche pap (1%) wordt verder met succes gebruikt tegen valschen meeldauw bij kool, uien, druif, rozen (het zwart, bladvalziekte bij bessen e.a.). Daar het vooral bij kool en uien uiterst moeilijk is de vloeistof op de bladeren te doen hechten, is het noodig zeer licht te spuiten, met den sproeidop ver van de planten verwijderd. Zoodra de fijne druppeltjes opgedroogd zijn, spuit men voor de tweede maal, weer zeer licht. Door dit eenige malen te herhalen, kan men een voldoende hoeveelheid pap op de planten brengen. Het toevoegen van harszeep (1%) verhoogt de kleefkracht zeer.

Goede middelen om Bordeauxsche pap te vervangen zijn Nosperit en koper kalk (Fusikrimp). In vele gevallen zal de gewoonte om een bepaald middel te gebruiken, soms de prijs, den doorslag geven.

Tegen *de* aardappelziekte zou ook Bordeauxsche pap gebruikt kunnen worden, men gebruikt echter voor dat doel uitsluitend

Bourgondische pap. Hierin is de kalk vervangen door sodex (watervrije soda). Het mengsel van kopervitriool en sodex, het zgn. normaal pappoeder, bevat deze stoffen in de verhouding van 2 op 1 en is direct voor het gebruik gereed. Om pap te maken, die overeenkomt met 1½% Bordeauxsche pap heeft men 2¼ kg normaal pappoeder op 100 L. water noodig. In het gebruik is normaal pappoeder dus eenvoudiger dan Bordeauxsche pap. De prijs is eenigszins hooger.

In het droge mengsel kunnen bij langdurige bewaring omzettingen plaats hebben. Het kopervitriool, dat in zuiveren toestand als helder blauwe kristallen tusschen de sodex voorkomt, heeft dan een groene kleur aangenomen. Groenachtig normaal pappoeder is niet voor het gebruik geschikt.

Alcalische Bourgondische pap. Het verschil met gewone Bourgondische pap bestaat in een hooger sodex gehalte. Alcalische Bourgondische pap maakt men zelf uit 1½ kg kopervitriool en 1½ kg sodex op 100 liter water.

Uit proefnemingen, die eenige jaren achtereen zijn genomen, is gebleken, dat de alcalisch Bourgondische pap een uitstekend middel is tegen den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw. Als men bij het allereerste optreden van de ziekte, welke zich meestal het eerst aan de bessen van de onderste (druip) takken vertoont of beter nog even daarvoor, (begin Mei), onmiddellijk goed spuit, zoodat alle bessen flink aan alle kanten geraakt worden, (dus de struiken vooral van onder op) dan kan men er zeker van zijn, dat men gezonde bessen oogst.

Getracht wordt met dit middel ook de scheuten vrij van meeldauw te houden.

Bij fellen zonneschijn mag niet gespoten worden, daar dan kans op bladbeschadiging bestaat. Men spuite het liefst in den namiddag. Bespuitingen na het midden van Mei uitgevoerd kunnen bladverbrandingen veroorzaken.

Californische pap. Dit middel, waarin zwavel het werkzame bestanddeel is, wordt naast Bordeauxsche pap zeer veel gebruikt. De bereiding is niet zoo eenvoudig. Het is echter in den handel verkrijgbaar.

Om pap te maken met een dichtheid van 20° Beaumé (de in ons land algemeen gebruikte) heeft men voor 34 liter water 5 kg

bloem van zwavel en 3 kg kalk noodig.

De zwavel wordt met eenige liters water tot een brij aangeroerd. Daarin wordt de kalk onder flink roeren gebluscht. Toevoeging van kleine hoeveelheden water is zoo nu en dan noodig om de massa brijachtig te houden. Als de kalk geheel gebluscht is, wordt de massa, die geel bruin gekleurd is, in 34 liter kokend water geworpen. Dit moet in een vrij groote ketel gebeuren, daar de vloeistof sterk begint te bruisen. Gedurende ongeveer één uur wordt de vloeistof gekookt en dan is de pap klaar.

Door te lang koken worden de werkzame bestanddeelen (polysulfiden) ontleed. Er vormt zich dan een groote hoeveelheid onoplosbare, onwerkzame stoffen. Zoodra men een sterke zwavelwaterstofgeur ruikt en de kleur in plaats van geelbruin, groen begint te worden, moet men met koken ophouden.

Bij het afkoelen zet zich een groen bezinksel af, waarboven een helder bruinroode vloeistof blijft staan. Deze heldere vloeistof wordt afgeheveld en kan onder afsluiting van de lucht (onder een laagje petroleum) onbepaalden tijd bewaard worden. Men hevelt daartoe de vloeistof òf in flesschen òf in vaatjes.

Is de dichtheid grooter dan 20° B, dan voegt men water toe, is de dichtheid geringer, dan laat men nog doorkoken tot 20° B bereikt is. De Californische pap, welke men in den handel koopt, moet op de dichtheid van 20° B gecontroleerd worden. De areometer voor zware vloeistoffen, het instrument, dat voor deze controle gebruikt moet worden, is in den handel verkrijgbaar.

Californische pap is een van de weinige middelen, die zoowel fungicide als insecticide eigenschappen bezitten.

Met een verdunning van 1 deel pap op 3 deelen water kan men 's winters de eitjes van bladluizen, schildluizen en mijten dooden.

Ook tegen schurft bij appel en peer wordt een winterbespuiting met 1 op 3 aanbevolen. Daar echter de voorjaarsbespuitingen met slappere en dus goedkoopere oplossingen voldoende zijn, wordt de winterbespuiting bij ons niet toegepast. Deze is veel te kostbaar, ook in vergelijking met carbolineum, waaraan men daarom als winterinsecticide algemeen de voorkeur geeft.

Een bespuiting met Californische pap 1 op 5 tegen het opengaan der bladknoppen is uitstekend ter bestrijding van de pokziekte bij peer en kort voor den bloei tegen rondknop bij zwarte bessen. De gevoelige soort Goliath moet men met 1 : 7 bespuiten.

1 op 7 wordt gebruikt tegen de krulziekte bij perzik minstens twee weken voor het opengaan der bloemknoppen.

Voor de tweede bespuiting tegen schurft bij appel (ook wel bij peer) wordt 1 op 40 gebruikt, voor een derde eventueel vierde bespuiting 1 : 50 à 1 : 60.

Tegen meeldauw (appel, Crataegus, roos, eik e.a.) is een bespuiting met 1 op 40 in den regel afdoende.

De zgn. meeldauw bij tomaten kan ook met 1 op 40 eenigszins bestreden worden. Het bezwaar is echter, dat de vruchten bezoedeld worden.

Bij bedekte lucht gebruikt men in kassen in den regel 1 op 40, bij zonneschijn mag men alleen 1 op 60 gebruiken.

Solbar. Dit middel kan zeer goed Californische pap vervangen. Het wordt als een bruinzwart poeder in den handel gebracht, met water gemengd (1 kg op 100 liter water) geeft het een bruingele vloeistof met een uiterst fijn verdeeld zwart neerslag. De vloeistof moet men voorzichtig afschenken, anders gaat het neerslag mee, waardoor verstopping van den sproeidop veroorzaakt wordt.

Roodkoperen pulverisateurs worden door zwavelpreparaten aangetast. Voor het gebruik van Californische pap en Solbar gebruikt men dus uitsluitend de zgn. geelkoperen pulverisateurs.

Salicylzuur. Ofschoon dit middel nog weinig gebruikt wordt, is het ter bestrijding van meeldauw zeer geschikt. Meeldauw in rozen kan er heel goed mee bestreden worden. In den regel mengt men het dan met zeepspiritus.

10 gr salicylzuur wordt eenigen tijd, voordat men gaat spuiten, in 100 cm^3 brandspiritus opgelost. Deze vloeistof mengt men met 10 liter water, waarin 2 ons zeep opgelost is.

Zooals reeds hier en daar is aangegeven kunnen fungiciden en insecticiden gemengd worden. Er zijn mengsels in den handel, door één bespuiting met een dergelijk middel bestrijdt men dan tegelijkertijd bepaalde zwammen en sommige insecten. Met Nosprosen en Nosprasit bestrijdt men b.v. de schurftziekte en vretende insecten (wormstekigheid).

III. HOE MOET DE BESPUITING WORDEN UITGEVOERD?

Alle besproeiingen kunnen niet op dezelfde wijze uitgevoerd worden. Bij de winterbespuitingen met carbolineum is het doel overwinterende diertjes of hun eieren te dooden. Zorgvuldig moeten stammen, takken en twijgen, waar de overwintering plaats heeft, aan alle kanten terdege bespoten worden. De vloeistof moet met kracht de voorwerpen raken, dan dringt zij door tot in fijne spleetjes en scheurtjes, de schuilplaatsen van de parasieten. Bij een carbolineumbespuiting moet de sproeidop op korten afstand langs stam en takken bewogen worden. Het is

niet gewenscht met carbolineum te spuiten tijdens vriezend of regenachtig weer. In het eerste geval bestaat er kans op beschadiging, in het tweede geval wordt de werking van het middel sterk verminderd.

Een bespuiting met een fungicide, b.v. Bordeauxsche pap, stelt daarentegen geheel andere eischen. Dit middel moet als een dun laagje de bladeren bedekken om te voorkomen, dat sporen, welke daarop neervallen, tot ontwikkeling komen. De bespuiting met Bordeauxsche pap kan dus licht zijn, mits alles toch met de pap wordt bedekt.

Het is voldoende als een zeer dun laagje van de vloeistof op de bladeren terecht komt en daar indroogt. De meeste bladeren kunnen zulk een dun laagje door adhesie wel vasthouden. Men verkrijgt dit door den sproeidop ver van de planten te houden. Op sommige gewassen met zeer gladde bladeren, o.m. uien en bloemkool, kan een bespuiting alleen succes hebben, als men elke samenvloeiing van druppeltjes voorkomt, daar de adhesie niet groot genoeg is, om deze samengevloeide druppeltjes vast te houden. Men moet dan zoo licht sproeien, dat alle druppeltjes afzonderlijk liggen. Als deze dan opgedroogd zijn, kan men nog eenmaal sproeien en zoo vervolgens tot de geheele oppervlakte is bedekt. Ook op zeer gladde bladeren kan een met zorg uitgevoerde bespuiting dus hechten. Het hechtend vermogen wordt vergroot door toevoeging van 1% harszeep.

De bespuitingen met fungiciden moeten eenige keeren plaats hebben om telkens de nieuw ontwikkelde bladeren met pap te bedekken of de van het oude blad af geregende pap te vervangen. In ons land wordt tegen de schurftziekte bij appels en peren vaak slechts tweemaal of driemaal gespoten.

Toch zijn in de meeste jaren herhaalde bespuitingen gewenscht. De echte fruittelers gaan dit inzien, zij spuiten de laatste jaren 5, 6 en 7 keer. Bij deze veelvuldige bespuitingen kan men met 1½%, soms met 1% Californische pap volstaan.

Aardappels dienen tegen Phytophthora ook verscheidene keeren bespoten te worden. Het is gebleken, dat het optreden en de uitbreiding van de ziekte afhankelijk zijn van en samengaan met bepaalde weersomstandigheden. Tegenwoordig worden de aardappeltelers door het koninklijk Meteorologische Instituut in de Bilt door draadlooze berichten gewaarschuwd, wanneer de omstandigheden voor de ziekte gunstig zijn. Er moet dan direct gespoten worden.

Een bespuiting met maagvergiften (Parijsch groen) kan ook zeer licht uitgevoerd worden. Bij deze bespuiting is het voldoende, dat kleine hoeveelheden van het vergif, desnoods pleksgewijs,

op de bladeren voorkomen. De vretende dieren krijgen dan toch steeds een doodende hoeveelheid in de maag.

Om goede resultaten te verkrijgen moeten de bespuitingen ook op het juiste tijdstip plaats hebben. Bordeauxsche pap en Alcalische Bourgondische pap, welke voorbehoedend werken, moeten eigenlijk verspoten zijn, voordat de ziekte optreedt. Aan dezen eisch kan niet steeds gemakkelijk voldaan worden. In verschillende gevallen is het voldoende te spuiten, zoodra de eerste verschijnselen van de ziekte waargenomen worden. Iets vroeger kan echter vaak ook zeer goed.

De bespuiting met Parijsch groen tegen wormstekigheid is ook nauw aan den tijd gebonden. Het rupsje van de wormstekigheid vreet zich meestal door de kelkholte naar binnen. Op die plaats moet dus het maagvergif zich bevinden. Dit is alleen te bereiken, als men onmiddellijk na den bloei spuit. Betrekkelijk korten tijd na den bloei krommen zich de kelkbladeren, waardoor zij de kelkholte afsluiten. Als dit omkrullen van de kelkbladeren reeds plaats gehad heeft, is een bespuiting vrijwel nutteloos.

Overigens spuit men met arsenicum-preparaten, zoodra vreterij optreedt. Moet een bespuiting plaats hebben op plantendeelen, die als voedsel moeten dienen, dan mag men niet meer spuiten als deze plantendeelen binnen vier weken na de bespuiting genuttigd worden.

De bespuiting met maagvergiften mag men ook *nooit tijdens den bloei* uitvoeren, omdat dan het gevaar voor bijen-vergiftiging te groot is. Bij fellen zonneschijn spuite men niet. Bladverbranding is dan niet buitengesloten. De namiddag is voor het spuiten het meest geschikt.

IV. SPROEIWERKTUIGEN

Tegelijk met het toenemend gebruik van sproeimiddelen heeft de techniek der sproeiwerktuigen zich krachtig ontwikkeld. De eenvoudige en onvoldoend werkende hulpmiddelen van vroeger zijn thans vervangen door apparaten, zoowel voor kleine tuinen als voor grootere bedrijven en voor het grootbedrijf, die aan hooge eischen voldoen.

In het begin heeft men zich van zeer primitieve gereedschappen bediend. Een bosje takken, samengebonden als een stalbezem, was reeds geschikt om de vloeistoffen op de planten te werpen. Telkens werd het bosje in de vloeistof gedompeld en de aanhechtende druppels over de planten geslingerd.

Een verbetering was het apparaat, bestaande uit een platte borstel met een slang verbonden aan een reservoir, dat op den rug

gedragen kon worden. De vloeistof vloeide langzaam in de borstel, zoodat regelmatig de planten besprenkeld konden worden.

Ook gebruikte men wel eens een gieter om de planten te bevochtigen. Het bezwaar was echter, dat men te veel vloeistof verbruikte, dat de vloeistof toch niet voldoende alle deelen der plant bevochtigde, niet voldoende ook in reten en holten doordrong en dat planten, die een vrij groote hoogte bereikten, niet behandeld konden worden.

Daarna is een eenvoudige spuit, de zgn. **kasspuit,** zooals men ook tegenwoordig nog wel gebruikt, gekomen. Het instrument bestaat uit een koker, waarin een zuiger op en neer bewogen kan worden. Bij het ophalen van den zuiger zuigt men de koker vol vloeistof, door het neerdrukken van den zuiger perst men de vloeistof door dezelfde opening, waardoor zij naar binnen kwam, met kracht weer uit. Op die wijze kan men de vloeistof op vrij grooten afstand verspuiten en al naar het mondstuk is, grover of fijner verdeelen.

Een moeilijkheid levert het richten met een dergelijke spuit. Door de groote kracht, welke noodig is om de vloeistof ver te verspuiten, is het zeer lastig een bepaalde richting te houden.

Deze moeilijkheid werd overwonnen door de uitvinding van de **pulverisateur.** Er waren vrijwel gelijktijdig enkele typen, van welke die van Vermorel (Pl. I fig. 1) wel de bekendste is.

Het instrument wordt op den rug gedragen, zoodat men de handen vrij heeft. Met de eene hand kan men de pomp in werking stellen, terwijl men met de andere hand de sproeislang zeer gemakkelijk kan richten.

De vloeistof bevindt zich in een vrij plat reservoir, waaruit het door een ventiel komt in een ruimte, waarin de pompinrichting geplaatst is.

Het voornaamste onderdeel van deze pompinrichting is een gummivlies (membraan), dat door een hefboom in en uit gestulpt kan worden. Door de bewegingen van het vlies wordt beurtelings een hoeveelheid vloeistof uit het reservoir gezogen en daarna in een luchtkamer geperst. Van daaruit stroomt het met kracht in de sproeislang.

De luchtkamer zorgt er voor, dat onder een regelmatigen druk gespoten kan worden. Zonder die inrichting zou de vloeistof, in het tempo van de pomp bewogen, met golfjes naar buiten komen.

Voor het besproeien van aardappels met Bordeauxsche pap wordt deze pulverisateur nog tamelijk veel gebruikt.

De ,,Besnard'' is een pulverisateur, die in vorm overeenkomt met de Vermorel, doch in werking geheel afwijkt. De ,,Besnard'' heeft geen membraan, doch een zuiger, welke zich niet in de pul-

verisateur bevindt, doch in een zuigerbuis, welke naast het reservoir is aangebracht en daarin op en neer bewogen wordt. Het voordeel van deze constructie is, dat bij een defect aan de pompinrichting herstellingen vrij gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De **automatische pulverisateur,** waarin, nadat het instrument met vloeistof gevuld is, lucht gepompt wordt tot een spanning, die voldoende is om alle vloeistof er uit te drijven, is weer een verbetering van het vorige type.

Deze pulverisateur bezit geen gummi-onderdeelen. Dit werd van groote beteekenis, toen carbolineum als bestrijdingsmiddel algemeen toegepast werd. Carbolineum toch tast rubber aan. De pulverisateur van Vermorel, die tamelijk veel gebruikt wordt voor het verspuiten van Bordeauxsche pap (op aardappelen), is door het bezit van een gummi membraan voor het verspuiten van carbolineum ongeschikt.

De automatische pulverisateur (Pl. I, fig. 3) bestaat uit een cylindervormig reservoir, waarbinnen zich een luchtpomp bevindt. Het handvat van de pomp bevindt zich op den kop van het reservoir. Door een opening, welke zich ook in den kop van het reservoir bevindt, wordt het reservoir voor $\pm$ $^2/_3$ met vloeistof gevuld.

Nadat deze opening goed is afgesloten, pompt men in het reservoir lucht, die in de ruimte boven de vloeistof terecht komt. Men pompt zoolang tot een druk van 4 à 5 atmosferen, op de manometer met een roode streep aangegeven, is bereikt. Dan is het instrument voor het gebruik klaar. De pulverisateur wordt ook op den rug gedragen, zoodat men nu beide handen vrij heeft. Met de rechterhand houdt men de sproeislang vast, de linkerhand kan men dan nog gebruiken om takken uiteen te buigen of van den grond op te heffen (bessenstruiken), zoodat men in staat is de plantendeelen, welke bespoten moeten worden, van alle kanten goed te raken.

Sommige sproeislangen worden met een kraan, andere met een druksluiting, afgesloten. Het voordeel van de druksluiting is, dat men met één hand de sproei-opening kan openen en sluiten. Het voortdurend drukken op de hefboom is echter vermoeiend en daarom geven velen de voorkeur aan een kraan, ofschoon men voor het openen en sluiten dan beide handen noodig heeft.

Er zijn verschillende typen van automatische pulverisateurs. Bij alle is het principe, lucht in het reservoir te pompen, waardoor de vloeistof met kracht uitgeperst kan worden. De verschillen berusten op wijzigingen in vorm, in de pompinrichting, ventielafsluiting e.d.

Er zijn verschillende eischen waaraan ze moeten voldoen. In de eerste plaats degelijke afwerking, zoodat de hooge druk geen gevaar kan opleveren.

De in ons land meest gebruikte merken voldoen aan dezen eisch. Het komt slechts zelden voor, dat een instrument niet de vereischte druk kan weerstaan. De aanwezigheid van een manometer is echter zeer gewenscht om te voorkomen, dat men het reservoir onder te hoogen druk brengt.

In de tweede plaats moeten er zoo weinig mogelijk, liefst in 't geheel geen, gummi-onderdeelen gebruikt worden.

Het vrij algemeene gebruik van carbolineum maakt het stellen van dezen eisch noodig. Carbolineum tast het gummi aan, zoodat dergelijke onderdeelen spoedig onbruikbaar worden, waardoor ook het geheele instrument onbruikbaar wordt. In sommige pulverisateurs komen nog wel ventiels met gummikogels voor. Deze moeten door koperen of glazen kogels vervangen worden.

In de derde plaats moet het metaal, waarvan de pulverisateurs gemaakt worden, bestand zijn tegen de verschillende sproeivloeistoffen, die er in gebruikt kunnen worden. Bourgondische pap en Californische pap stellen in dit opzicht bijzondere eischen. Bourgondische pap tast ijzer vrij sterk aan, terwijl ook zink en tin niet tegen deze pap bestand zijn. Ook gegalvaniseerd (vertind) ijzeren pulverisateurs zijn dus voor Bourgondische pap ongeschikt. Roodkoper kan niet gebruikt worden, omdat het door Californische pap aangetast wordt. Het is beslist verkeerd om een roodkoperen pulverisateur langeren tijd voor het verspuiten van Californische pap te gebruiken.

Een legeering, die wel tegen Californische pap bestand is, heeft men gevonden in het zgn. California-metaal (zgn. geelkoper).

Deze legeering is een mengsel van koper, zink en tin.

De zgn. geelkoperen pulverisateurs zijn tegen alle gebruikelijke bestrijdingsmiddelen bestand. Met één instrument kan men dus alle noodige vloeistoffen verspuiten.

Lood is ook tegen alle gebruikelijke bestrijdingsmiddelen bestand. Dit metaal gebruikt men daarom wel om er de wanden van ijzeren pulverisateurs mee te bekleeden.

Bij het aanschaffen van pulverisateurs koope men dus uitsluitend de geelkoperen of de met lood bekleede instrumenten.

In ons land worden het meest gebruikt de Calimax (Platz), de „Holder" (Holder) en de Pomonax (Altmann). Dit zijn zeer goede pulverisateurs, zooals door jarenlang gebruik gebleken is.

Om het voortdurende „op lucht" pompen, een werk, dat op den langen duur ongetwijfeld vermoeiend wordt, zooveel mogelijk te verlichten, heeft men de zgn. **batterij-spuiten** (Pl. II, fig. 5)

vervaardigd. De reservoirs hebben den gewonen vorm van de automatische pulverisateurs, maar bezitten geen pomp. De vulling geschiedt op geheel andere wijze.

De pulverisateurs worden ter vulling op een stellage boven een groot vat met sproeivloeistof geplaatst. Door middel van een pomp met langen hefboom, die op het vat gemonteerd is, wordt eerst lucht ingepompt ($1\frac{1}{2}$ à 2 atm). Dan wordt een slang, welke in de vloeistof hangt, aangekoppeld.

Met dezelfde pomp, waarmede men eerst lucht heeft ingepompt, pompt men nu de vloeistof in. Daardoor wordt de ingeperste lucht nog verder samengedrukt, zoodat de spanning grooter wordt. Men pompt zooveel vloeistof in, tot een spanning van 5 à 6 atm. bereikt is. Het reservoir wordt nu als gewone pulverisateur op den rug gehangen en de vloeistof daaruit op dezelfde wijze verspoten.

Als het reservoir leeg gespoten is, kan de lucht *niet* ontsnappen, doordat een kogelventiel zich sluit, zoodra alle vloeistof verspoten is. Daarna pompt men weer vloeistof in, zoodat slechts éénmaal, bij het begin, lucht behoeft ingepompt te worden. Daar er echter steeds eenige lucht ontwijkt, moet af en toe nog wat lucht bijgepompt worden om den druk van $1\frac{1}{2}$ à 2 atmosfeer te onderhouden.

Het pompen met een langen hefboom verlicht het werk aanmerkelijk.

Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij enkele Belgische automatische pulverisateurs. Bij deze bevindt zich de zuigperspomp, waarmede het reservoir gevuld wordt, in de sproeibuis, welke dan meestal van koper is. Eerst wordt weer een hoeveelheid lucht ingepompt ($\pm$ 2 atm.). Dan plaatst men de sproeibuis in de vloeistof en pompt verder de noodige hoeveelheid vloeistof in het reservoir.

In het Westland worden deze pulverisateurs wel gebruikt, soms geeft men aan dit soort zelfs de voorkeur boven die, waarin na iedere vulling, lucht gepompt moet worden.

Het spuiten met deze instrumenten is zwaarder dan met de gewone automatische pulverisateurs, omdat de sproeibuis, in plaats van een gummislang, een koperen koker met zuigperspomp is. Een bezwaar is ook, dat het instrument geen manometer heeft, zoodat men aan het aantal pompslagen moet bepalen, tot welke hoogte men den druk heeft opgevoerd. Men moet bij het vullen de voorschriften zeer nauwkeurig volgen daar men anders kans heeft, dat de machine uiteen springt.

De Matador (Platz) heeft dit bezwaar niet. Ook is bij deze pulverisateur de pomp niet in de sproeibuis aangebracht, doch

bevindt deze zich, evenals bij de gewone automatische pulverisateurs, in het reservoir. Om het pompen te verlichten kan het handvat aan een hefboom bevestigd worden.

De Muratori is een dergelijk instrument, dat ook tamelijk veel gebruikt wordt. Bij deze pulverisateurs is de pomp echter niet binnen het reservoir, maar er buiten aangebracht.

Het zware pompen kan ook vermeden worden door op de pulverisateurs, op de plaats, waar gewoonlijk de pomp is aangebracht een ventiel, bv. ventiel van een autoband, te monteeren. Met een electrische pomp, of met cylinders samengeperste lucht, kan men dan de pulverisateurs op druk pompen. Door den Heer De Groot te Berlikum is zoo'n ventiel op een gewone Calimax aangebracht. Het op druk pompen met een electrische pomp geschiedt in $^1/_3$ van den tijd, noodig voor het op druk pompen met de handpomp. In vele gevallen kan van deze constructie gebruik gemaakt worden.

De vloeistofinhoud van de tot nu toe besproken pulverisateurs bedraagt ongeveer 12 liter. Bij een druk van $\pm$ 4 atmosferen wordt deze inhoud in 4 minuten uitgespoten. Voor bezitters van kleine tuinen zijn deze instrumenten te groot. Voor hun doel zijn beter geschikt de pulverisateurs met kleineren inhoud (7 liter). Voor zeer kleine tuintjes zijn ook deze nog te groot. Dan zijn kleine handpulverisateurs van $\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ liter inhoud (Pl. I, fig. 2) meer geschikt.

In kassen en in kleine tuinen kan in plaats van een rugpulverisateur een *voetpomp* gebruikt worden. De pompbuis wordt in het vloeistofreservoir (emmer, vat) geplaatst met de voetsteun naar buiten, men pompt als bij een fietspomp. Door een lange slang wordt de vloeistof geperst en zeer fijn verstoven.

Een dergelijk apparaat is de *Solo sproeier*. Bij dit instrument is de pomp in de sproeipijp aangebracht, het voordeel is, dat slechts één persoon voor het sproeien noodig is, bij de voetpomp zijn twee personen noodig. Een bezwaar is, dat het pompen tamelijk vermoeiend is.

Voor het besproeien van aardappels met Bourgondische pap tegen Phytophthora infestans worden in streken, waar de cultuur niet op smalle akkers (zooals in Friesland) gedreven wordt, gebruik gemaakt van **paardesproeimachines** (Pl. III, fig. 8).

Het reservoir is geplaatst op een onderstel, waarvan één der wielen langs de as versteld kan worden, men kan den afstand tusschen de wielen dus regelen in verband met de plantwijdte der aardappels.

De pomp wordt aangedreven door een kracht, welke ontleend wordt aan de draaiende wielen. In het reservoir is een roerinrich-

ting, die ook door de draaiende wielen in beweging wordt gebracht.

Achter het reservoir bevindt zich een lange sproeipijp, waaraan op onderling gelijke afstanden verstuivers zijn aangebracht. Sommige machines bezitten zoowel hoog geplaatste naar beneden gerichte als laag geplaatste naar boven gerichte sproeiers. Deze laatste beschadigen het loof bij een welig ontwikkeld gewas vrij ernstig, het is gebleken, dat met boven sproeiers alleen volstaan kan worden.

Hoe breeder de strook is, die in één gang besproeid kan worden, hoe beter. Men behoeft dan minder vaak door het gewas te rijden. Een breede sproeipijp verdient dus aanbeveling.

De sproeibuis moet ook liefst verstelbaar zijn, bij een hoog gewas kan men de buis dan hooger stellen. Het is nl. gewenscht, dat de sproeivloeistof uiterst fijn verdeeld op de bladeren terecht komt. Dit bereikt men alleen als de afstand tusschen den sproeidop en de bladeren niet te klein is.

Voor een grondige bespuiting van boomgaarden zijn de rugpulverisateurs onvoldoende gebleken. In ons klimaat zijn de perioden, welke voor het spuiten gunstig zijn, vaak van korten duur. Wel kan men met carbolineum van December tot Maart spuiten, maar gedurende die maanden zijn er toch maar betrekkelijk weinig goede spuitdagen. De eerste bespuiting tegen schurft moet kort voor den bloei plaats hebben, de tweede bespuiting tegen schurft moet, als zij tevens ter bestrijding van de wormstekigheid zal dienen, binnen één week na den bloei uitgevoerd worden. Tegen vretende insecten moet direct als de vreterij begint, gespoten worden. Een goede bestrijding eischt dus een snelle uitvoering van de werkzaamheden. Met gewone rugpulverisateurs is dat niet mogelijk.

De **rijdbare sproeimachines** (Pl. II, fig. 6) waren reeds een groote verbetering. Zij hebben een grooter reservoir en een krachtiger pomp, die het mogelijk maakt met twee slangen te spuiten. Door middel van een langen hefboom, die door één man bewogen kan worden, wordt de zuig-perspomp in werking gebracht. Bij de opgaande slag wordt vloeistof in de cylinders gezogen, bij den neergaanden slag wordt de vloeistof in den windketel geperst.

De windketel dient om een gelijkmatigen druk van $\pm$ 10 atm. te verkrijgen, zoodat de vloeistof voortdurend en met kracht verspoten wordt. Boven op den windketel bevindt zich de aansluiting voor de slangen, terwijl daar ook de manometer aangebracht is, die den persdruk aangeeft.

Deze pompen zijn gemonteerd op rijdbare geelkoperen of verlood ijzeren reservoirs van het kruiwagen model (Rhenania, Teutonia, Weeks e.a.).

Ook zijn ze wel aangebracht op een houten vat (Pl. I, fig. 4), dat op een kar, een lorrie of op een speciaal wielstel (met kipbare ophanging) geplaatst kan worden.

Op deze wijze kan men met betrekkelijk lage kosten een verplaatsbare spuit met vrij groote capaciteit maken. De monteering op het vat heeft ook het voordeel, dat de pomp gemakkelijk uitgenomen en schoongemaakt kan worden. Het deksel van het vat moet ook uitneembaar zijn, daar anders het vat inwendig niet goed schoongemaakt kan worden.

Ervaren spuiters kunnen met een vatspuit 2 à 3 ha boomgaard per dag behandelen. Er zijn dan vier personen noodig, nl. twee spuiters, één pomper en één jongen, die geregeld de sproeivloeistof klaar maakt en in het vat giet. Hij kan tevens behulpzaam zijn bij het voortrijden van de spuit.

Hoewel de rijdbare sproeimachines voor niet te groote boomgaarden of voor fruittuinen met ondercultuur van bessen ongetwijfeld zeer bruikbare instrumenten zijn, moeten ze toch meer en meer wijken voor de motorsproeimachines. Het wordt den fruittelers duidelijk, dat, willen zij de Nederlandsche markt voor het inlandsche fruit behouden en den afzet naar het buitenland weer doen toenemen, de kwaliteit van ons fruit zeer veel moet verbeterd worden. De noodzakelijkheid van een krachtige schurftbestrijding, waarvoor jaarlijks verscheidene bespuitingen noodig zijn, wordt langzamerhand door de meeste fruittelers gevoeld. Voor een goede uitvoering van deze bespuitingen, vooral voor het op het juiste tijdstip spuiten, zijn de motorsproeimachines onmisbaar.

Bezitters van groote boomgaarden hebben zich zelf zoo'n machine aangeschaft, een enkele keer wordt coöperatief een motorspuit gekocht, terwijl ook verschillende fruittelers de bespuitingen door zgn. loonspuiters laten uitvoeren. Het stelsel van een loonspuiterij zal zich ongetwijfeld uitbreiden. Bij een goede controle op de te gebruiken middelen en een garantie voor het op tijd spuiten heeft het stelsel groote voordeelen.

De **motorsproeimachine** kan zoowel rijdend als stationair (blijvend op één voetpunt opgesteld) zijn.

Bij beide typen onderscheidt men 1° het vloeistofreservoir, waarin een roerinrichting is aangebracht; 2° de pomp en 3° de motor om de pomp aan te drijven.

1°. Het *reservoir* kan verschillende vormen en afmetingen hebben. Bij de rijdbare spuiten varieert de inhoud van 330 liter tot 1000 liter.

Er bestaan spuiten met een houten en andere met een metalen reservoir. Hout wordt door geen enkele sproeivloeistof aangetast,

men zal echter moeten zorgen, dat het hout steeds eenigszins vochtig blijft, om krimpen en lek worden te voorkomen.

Metalen reservoirs zijn waarschijnlijk duurzamer. Zij moeten van een bijzondere koperlegeering (koper, zink en tin), die ook tegen alle sproeivloeistoffen vrijwel volkomen bestand is, vervaardigd zijn.

Het *roerapparaat* bestaat meestal uit een as, die dicht bij den bodem in de lengte richting door het reservoir loopt. Op deze as, die door de motor matig snel bewogen wordt, zijn schoepen aangebracht. Als de motor werkt, wordt de vloeistof dus voortdurend in beroering gebracht, zoodat stoffen, die in de vloeistof zweven (Bordeauxsche pap, Parijsch groen, loodarsenaat) niet kunnen bezinken.

2°. De tot nu toe gebruikte *pompen* zijn plunjer (zuiger) pompen; centrifugaalpompen zijn wel beproefd, doch hebben niet voldaan, zij hebben per liter verspoten vloeistof een veel te hoog benzine verbruik.

Door de op- en neer- of heen- en weergaande beweging van den plunjer (zuiger) wordt vloeistof uit het reservoir aangezogen en weggeperst naar een windketel. Als de doorsnede van den plunjer D. is, dan is de oppervlakte $\frac{\pi D^2}{4}$. Bij een afstand s tusschen de uiterste plunjer standen, is de hoeveelheid vloeistof, die bij één zuigerslag aangezogen wordt $\frac{\pi D^2}{4} \times s$.

In de pompen met twee cylinders (niet te verwarren met de cylinders van de motor, die de pomp aandrijft), welke dan meestal in elkanders verlengde liggen, is elke zuigslag tevens een persslag. Bij elke beweging van den zuigerstang wordt dus ook een hoeveelheid vloeistof $= \frac{\pi D^2}{4} \times s$ weggeperst. Als het aantal zuigerslagen per minuut n bedraagt, is de hoeveelheid vloeistof, die de pomp per minuut kan leveren dus $\frac{\pi D^2}{4} \times s \times n$. Deze theoretische maximale hoeveelheid levert de pomp nooit, er heeft altijd in de pomp eenig verlies plaats.

Het hangt, zooals nog nader uiteengezet zal worden, van verschillende omstandigheden af of de hoeveelheid vloeistof, die de pomp kan leveren, ook werkelijk verspoten wordt.

3°. Vooraf dient iets over de *motoren* te worden meegedeeld.

Bij de rijdbare motorsproeimachines wordt gebruik gemaakt van benzine (explosie) motoren. Hierbij onderscheidt men twee- en viertakt motoren.

Het aantal omwentelingen van de motoras is grooter dan het aantal omwentelingen van de as van de pomp, deze vertra-

ging wordt door de verschillende tandraderen tot stand gebracht. Bij motoren met een hoog toerental (groot aantal omwentelingen per minuut) moet de vertraging natuurlijk veel grooter zijn dan bij motoren met een laag toerental. Het toerental van de in ons land gebruikte motoren loopt van 3000 (Duitsche motoren) Pl. VI fig. 14 tot 1000 à 600 (Amerikaansche machines) Pl. VI fig. 15 en Pl. VII fig. 16. In het algemeen neemt men aan, dat de slijtage bij de snelloopende motoren grooter zal zijn dan bij de langzamerloopende. De duurzaamheid hangt echter afgezien nog van de behandeling en verzorging, ook van andere factoren (materialen, smering e.d.) af, zoodat men niet zonder meer aan de Amerikaansche machines een langeren levensduur dan aan de Duitsche kan toeschrijven. Bovendien zijn de Duitsche machines goedkooper, ze worden dus sneller afgeschreven en mogen desnoods eerder versleten zijn.

Aan de motorsproeimachines zijn meestal twee slangen gekoppeld. Deze slangen kunnen bevestigd worden aan de gewone sproeibuizen, met of zonder bamboe tusschenstuk, die bij de rugpulverisateurs gebruikt worden. Tegenwoordig worden echter meestal de zgn. *sproeigeweren* Pl. II (fig. 7) gebruikt. Soms ziet men ook wel sproeistokken met drie of meer sproeidoppen. Deze worden wel meervoudige verstuivers genoemd. De sproeigeweren bestaan uit een koperen buis, aan welks einde een bijzondere sproeidop is aangebracht. De uitlaatopening kan, ten einde de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, te regelen, grooter en kleiner gemaakt worden, door schijfjes met een grooter of kleiner gaatje aan het uiteinde van de sproeibuis te plaatsen. Op eenigen afstand van het ingezette schijfje bevindt zich in de sproeibuis een schijfje met een aantal schuingeboorde gaatjes. Bij het passeeren van deze gaatjes krijgt de vloeistof een draaiende beweging, uit de sproeiopening ontwijkt deze sneldraaiende vloeistof als een nevel (breede verspreiding). Het plaatje met de schuingeboorde gaatjes kan naar het schijfje met de sproeiopening toe bewogen worden, hoe dichter de plaatjes elkander naderen hoe meer de nevel in een straal (smalle verspreiding) overgaat.

In het laatste geval wordt de vloeistof tot groote hoogte (12 à 15 m) met groote kracht verspoten, in het eerste geval wordt de vloeistof over een groote breedte, doch minder hoog, verspoten. Voor verschillende doeleinden zijn de sproeigeweren dus bruikbaar.

Het verplaatsen der schijfjes geschiedt bij de Amerikaansche sproeigeweren door een draaibeweging, bij de Duitsche instrument door een drukbeweging. De eerste zijn gemakkelijker in het gebruik en zijn daarom te verkiezen boven de laatste.

De lengte der sproeigeweren varieert van $\pm$ 60 cm tot 1.50 m.

Ofschoon de lange natuurlijk zwaarder zijn, acht men ze toch practischer, daar men een beter gezicht op het spuiten heeft.

De *meervoudige verstuivers* (Pl. III, fig. 9) voeren de vloeistof niet zoo hoog op als de sproeigeweren. Zij kunnen daarom alleen bij niet te hooge boomen gebruikt worden, tenzij de spuiters op sproeitorens staan.

De lengte der slangen kiest men in overeenstemming met den aard van het bedrijf. In boomgaarden met gras, waar men met de machine gemakkelijk tusschen de rijen kan door rijden, kunnen vrij korte slangen gebruikt worden, in den regel gebruikt men dan slangen van $\pm$ 15 M. lengte.

In boomgaarden met bessen als onderbeplanting of in fruittuinen met struiken, waar de machine niet zoo gemakkelijk verplaatst kan worden, komt men er toe langere slangen te gebruiken. De machine rijdt dan bv. langs het hoofdpad en de aanplantingen aan weerszijden daarvan worden strooksgewijs bespoten. De lengte der slangen moet dan iets grooter zijn dan de breedte der perceelen langs het hoofdpad.

De lengte der slangen kan echter niet willekeurig grooter genomen worden, er zijn grenzen. Door de wrijving van de vloeistof langs de wanden van de slang, heeft er drukverlies plaats. Hoe wijder de slangen en hoe gladder de wanden zijn, des te geringer is het drukverlies.

De druk neemt af volgens de formule $w = \lambda \times \frac{l}{d} \times \frac{v^2}{2g}$.

Gebruikt men slangen met een inwendige diameter van $^1/_2$ duim dan is $\lambda = a + \frac{0{,}0018}{\sqrt{vd}}$, voor slangen en buizen met gladden wand is $a = 0{,}02$.

v = de snelheid van de vloeistof in meters per sec.
d = doorsnede slang of buis in meters.
l = de lengte van slangen of buizen.
g = versnellig zwaartekracht = 9,81.

I. Bij een vloeistofverplaatsing van 40 liter per minuut is de snelheid $v = 5{,}85$ m per sec.

II. bij een vloeistofverplaatsing van 20 liter per minuut is de snelheid $v = 2{,}92$ m per sec.

In geval I is $\lambda = 0{,}02 + \frac{0{,}0018}{\sqrt{5{,}85 \times 0{,}012}} = 0{,}0268$.

dus $w = 0{,}0268 \times \frac{1}{0{,}012} \times \frac{5{,}85^2}{2 \times 9{,}81} = 3{,}91$ l.

In geval II is $\lambda = 0{,}02 + \frac{0{,}0018}{\sqrt{2{,}92 \times 0{,}012}} = 0{,}0296$.

dus $w = 0{,}0296 \times \frac{1}{0{,}012} \times \frac{2{,}92^2}{2 \times 9{,}81} = 0{,}971$ l.

De beteekenis van deze cijfers is, dat het drukverlies per m

lengte van de slang in geval I 3,91 × 0,1 atm, in geval II 0,971 × 0,1 atm. is.

Voor een slang van 10 m lengte is het drukverlies in geval:
I 10 × 3,91 × 0,1 atm = ± 4 atm.
II 10 × 0,971 × 0,1 atm. = ± 1 atm.

Moet men, in verband met de omstandigheden, ver van de machine spuiten, dan is men genoodzaakt buizen met grooter diameter te gebruiken. Men komt dan tot het systeem van een buizenleiding, dat nog nader behandeld zal worden.

Vloeistof verbruik. Er is reeds op gewezen, dat de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, niet gelijk is aan de hoeveelheid, die de pomp kan leveren. De hoeveelheid verspoten vloeistof hangt af van den druk, waaronder de vloeistof den sproeidop verlaat, van den diameter van de sproeiopening (dus van de grootte van het gaatje) en van de zgn. contractie-coëfficiënt, die weer verband houdt met den vorm en de grootte van de sproeiopening, wijdte der slangen en den aard van de sproeivloeistof.

Als de pomp in den windketel meer vloeistof perst dan er verspoten wordt, moet de druk natuurlijk toenemen. Om te voorkomen, dat de druk te groot zou worden en de ketel uit elkander zou springen, is een veiligheidsklep aangebracht, die bij een bepaalden druk geopend wordt.

Het te veel aan vloeistof wordt dan òf naar het reservoir teruggevoerd òf het blijft in de pomp circuleeren, al naar de constructie van de pomp.

De veiligheidsklep wordt al spoedig geopend als de sproeikranen gesloten worden, terwijl de motor blijft loopen b.v. als de spuiters van den eenen naar den anderen boom gaan; zonder veiligsheidsklep, zou telkens als men even met spuiten ophield, de motor afgezet moeten worden. Een regelmatig verloop van de werkzaamheden zou dan niet mogelijk zijn.

Het kan echter ook gebeuren, dat de veiligheidsklep geopend wordt, terwijl er nog gespoten wordt. Dit moet voorkomen worden, omdat dan de motor onnoodig werk verricht en meer benzine verbruikt dan noodig is.

Gedeeltelijk kan dit voorkomen worden door de motor langzamer te laten loopen, men moet er daarbij op letten, dat er voldoende druk in den windketel blijft. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet men niet de motor langzamer laten loopen (de hoeveelheid vloeistof, die de pomp levert, kleiner maken) doch de sproeiopening grooter maken (de hoeveelheid vloeistof, die verspoten wordt, grooter maken). De invloed, die de sproeiopening heeft, blijkt wel uit de volgende cijfers:

Een sproeigeweer met een opening van $^{4}/_{64}$ inch (1,6 mm) kàn

± 9 ltr vloeistof per minuut geven.

Een sproeigeweer met een opening van $^5/_{64}$ inch (2 mm) kàn ± 18 ltr vloeistof per minuut geven.

Voortbeweging. De rijdbare motorsproeimachines worden meestal door één paard getrokken. In sommige gevallen (machines met groot reservoir, zachte bodem) zal men wel twee paarden noodig hebben.

Er zijn ook motorsproeimachines, die zelfbewegend zijn. De motor wordt dan tevens benut voor de voortbeweging. In ons land hebben deze machines nog geen opgang gemaakt.

In streken, waar de akkers slechts per boot bereikbaar zijn (de Streek, de Langendijk) plaatst men den motor in een boot, waarin ook het vloeistofreservoir een plaats moet vinden. De slangen, welke op een rondsel gewonden zijn, trekt men, zoover het noodig is, op de akkers. Men kan dan telkens een strook, die loodrecht op de sloot staat, bespuiten. Begint men zoover mogelijk van de sloot af, dan kan onder het spuiten de slang langzaam op den rondsel gewonden worden tot men de sloot weer genaderd is. De boot wordt dan eenige meters verplaatst, waarna men een aangrenzende strook kan bewerken.

Bij deze methode moet men er ook aan denken, dat de slangen, in verband met de vermindering van den druk, niet te lang mogen zijn.

Het **vullen der reservoirs** geschiedt met behulp van de pomp. Bij de methode, die vroeger uitsluitend en tegenwoordig nog vaak wordt gevolgd, wordt een slang, waarvan het ondereinde, van een zeef voorzien, in de sloot ligt, aan de pomp verbonden. De pomp zuigt het water op en perst het naar het reservoir. Voor het vullen van een reservoir met een inhoud van ± 300 ltr is ongeveer 7 minuten noodig.

Vlugger geschiedt het vullen met behulp van een *injecteur*. In een houten zuigkorf, waaraan twee slangen verbonden kunnen worden, bevindt zich een haakvormig omgebogen buis. Het spits toeloopende einde van deze buis mondt uit in een ruimte, welke zich bevindt tegenover een tweede buis. De eerste, haakvormige, buis wordt met een der slangen aan de pomp gekoppeld, de tweede buis wordt met de andere slang aan het reservoir verbonden.

Stelt men nu de pomp in werking, dan wordt een kleine hoeveelheid vloeistof uit het reservoir, dat nooit heelemaal leeggespoten mag worden, geperst door de haakvormige buis. Het spuit door het conische mondstuk met kracht in de ruimte, waarin de lucht sterk verdund wordt. Hierdoor wordt het water uit de sloot, waarin den zuigkorf ligt, aangezogen en met de pers-

vloeistof naar het reservoir gevoerd.

Door een kleine hoeveelheid vloeistof, welke onder hoogen druk uit het reservoir wordt gepompt, wordt een groote hoeveelheid water onder lagen druk in het reservoir gebracht.

Bij een perscapaciteit van de pomp van ca. 25 ltr per minuut bedraagt de zuigcapaciteit van den injecteur ongeveer 100 ltr per minuut. Een reservoir van ± 300 ltr kan met den injecteur dus in ± 3 minuten volgepompt worden.

Vaststaande motoren. In streken, waar de machine moeilijk verplaatst kan worden, b.v. in fruitplantages met onderbeplanting, of waar men lange smalle akkers heeft, die slechts aan één der korte zijden aan het water grenzen, is men aangewezen op een vaststaanden motor met een buizenleiding. Deze buizenleiding kan vastliggen, o.a. op smalle akkers, waar men dan slechts een rechte leiding, met kranen op verschillende plaatsen, noodig heeft, maar ook kan men (b.v. op breedere perceelen), gebruik maken van verplaatsbare leidingen. Men moet het stelsel, door gebruikmaking van driewegkranen, zoo inrichten, dat tijdens het spuiten gedeelten van de leiding verplaatst kunnen worden. Men heeft dan minder buizen noodig, terwijl op deze wijze tevens regelmatig doorgewerkt kan worden. Voor besparing op de buisleiding moet zooveel mogelijk gezorgd worden, want de aanleg is vrij duur. Tegenover de hooge aanlegkosten staat echter het voordeel, dat het vloeistoftransport niets kost, terwijl juist bij rijdbare sproeimachines, vooral als het water van een ver verwijderd punt gehaald moet worden, de kosten voor het transport hoog zijn.

De wijdte der buizen hangt af van de lengte van het buizenstelsel. Ook op het verstverwijderde gedeelte moet men een voldoenden druk hebben.

Met het oog op het drukverlies in de buizen, moet bij stationaire sproeimachines, vooral als ook hoogstammen bespoten moeten worden, een motor met grootere capaciteit gebruikt worden.

Men dient buizen te gebruiken, die aan de binnenzijde verlood zijn, opdat zoowel Bordeauxsche als Californische pap verspoten kan worden.

De motor plaatst men op een punt, dat zich het best daarvoor leent, liefst dichtbij het water, zoodat onnoodig transport vermeden wordt.

Om voortdurend te kunnen spuiten dient men twee groote reservoirs te hebben, die om beurten met de pomp verbonden kunnen worden of één groot reservoir, dat steeds met de pomp verbonden blijft en één kleiner reservoir, waarin de sproeivloei-

stof wordt klaargemaakt en waaruit men de klaargemaakte vloeistof naar het groote reservoir kan laten vloeien.

De hoeveelheid vloeistof in het kleine reservoir moet dan ongeveer gelijk zijn aan de hoeveelheid, die tijdens het klaarmaken verspoten wordt.

Terwijl voor rijdbare spuiten uitsluitend benzine motoren gebruikt worden, kan men voor de vaststaande machines met succes electromotoren gebruiken.

Bij den Heer Blokland te Hees is een dergelijke motor gemonteerd. Pl. V, Fig. 12, geeft een afbeelding van de installatie.

Men ziet in fig. 13 alleen de pomp met het drijfwiel, dat door een riem met den motor verbonden is. In fig. 12 ziet men de pomp (links) en het reservoir (rechts). Onderaan bevindt zich de buis, die het reservoir met de pomp verbindt, daarboven ziet men de persleiding die door het dak van de schuur naar buiten gaat. Het hoogste punt van de buisleiding bevindt zich hier dichtbij de pomp. Blijkbaar is deze opstelling beter dan bij een montage, waarbij het hoogste punt van de buisleiding ver van de pomp verwijderd is.

Het toerental van de motor kan door een weerstand geregeld worden. Als de druk in den windketel te hoog wordt, wordt de veiligheidsklep, tusschen vliegwiel en pomp zichtbaar, gelicht, dan blijft de overtollige vloeistof in de pomp circuleeren, er wordt dus geen vloeistof naar het reservoir teruggepompt.

Het circuleeren van vloeistof in de pomp mag korten tijd, b.v. bij het sluiten der sproeikranen, plaats hebben, een voortdurend circuleeren moet echter vermeden worden, o.a. door het toerental van de motor te verlagen of de sproeiopeningen te verwijden.

Het voordeel van electro-motoren is, dat zij bedrijfszekerder zijn dan benzine-motoren. Bij deze laatste komen wel eens storingen voor.

Sproeimachines zonder motoren. Om de onzekerheid van motoren te ontgaan is door de heeren Zendijk te Olst een installatie geconstrueerd, waarbij zoowel de motoren als de pompen vervallen en de druk verkregen werd uit cylinders samengeperste lucht. Aanvankelijk werden de cylinders direct aan een groot vloeistofreservoir gekoppeld. Als dat reservoir leeggespoten was, moest men de aanwezige lucht, die nog een vrij groote spanning had, laten ontsnappen, wat niet economisch was.

Later heeft men naast het groote reservoir twee kleinere geconstrueerd, waarin de vloeistof geperst wordt. De lucht, welke na het leegspuiten van één der kleinere reservoirs achterblijft, wordt benut om het andere reservoir gedeeltelijk met vloeistof

te vullen. Op deze wijze gaat slechts een gedeelte van de lucht verloren.

Het apparaat bevindt zich nog in het proefstadium. Misschien kunnen nog meer verbeteringen aangebracht worden, zoodat het wellicht mogelijk is op deze wijze een geschikte en bedrijfszekere sproeimachine te vervaardigen.

De fa. de Kroes te Overschie heeft een andere installatie bedacht, waarbij wel een motor met luchtcompressor gebruikt wordt. De samengeperste lucht wordt in een windketel verzameld, van daaruit gaan twee slangen, één naar de vloeistoftank, welke dus onder druk staat ten einde de vloeistof over een langen afstand te verplaatsen of hoog te kunnen opvoeren, de andere slang voert de lucht direct naar een pistool. Daar wordt de lucht gemengd met de vloeistof, die nu als een nevel het pistool verlaat, een bijzonder fijne verstuiving wordt daardoor verkregen. Ook hier zou de motor met luchtcompressor waarschijnlijk door cylinders samengeperste lucht vervangen kunnen worden.

Berekening der spuitkosten

Als voorbeeld zal genomen worden een boomgaard-complex van 10 ha.

De bezitter kan zelf een motor aanschaffen of het spuitwerk door loonsproeiers laten verrichten.

Een rijdbare motorsproeimachine kost f 1000 à f 2500. Na 7 à 10 jaren zal deze versleten zijn, voor afschrijving moet derhalve f 125,— à f 250,— in rekening gebracht worden, voor onderhoud zal men ± f 150,— per jaar moeten bestemmen.

Voor het bespuiten van 10 ha boomgaard heeft men, aannemende dat per dag 2½ ha behandeld wordt (in den regel kan men per dag een grooter oppervlak bespuiten), dus 4 dagen noodig.

Voor een volledige bespuiting geldt één carbolineumbespuiting, één bespuiting met Bordeauxsche pap en vier bespuitingen met Californische pap. Er dienen dus zes bespuitingen te worden uitgevoerd, waarvoor men op ongeveer 25 spuitdagen kan rekenen, per dag wordt 10 uur gewerkt.

Het benzineverbruik is ± 2 liter per uur, voor de volledige bespuiting van 10 ha heeft men ongeveer 500 liter benzine noodig. De benoodigde hoeveelheid olie bedraagt ongeveer het tiende gedeelte hiervan, dus ± 50 liter.

Bij een bezineprijs van 10 ct. per liter en een olieprijs van 60 ct. per liter, heeft men voor 10 ha per jaar dus een uitgave van benzine en olie van ± f 80,— (stel f 100,—).

Er zal dagelijks met twee man gewerkt moeten worden, terwijl één paard noodig is voor het voortrijden van de sproeimachine. De kosten van personeel en paard op f 12,50 per dag stellende, komt men tot een bedrag van ± f 325,— per jaar als arbeidsloon (Een boomgaard bezitter, die zelf paarden bezit en zelf personeel in dienst heeft, die voor het spuiten dus geen extra loon behoeft uit te geven, zal deze post niet in rekening brengen).

Aangenomen mag worden dat gemiddeld per ha 70 flinke fruitboomen staan. Bij de carbolineumbespuiting zal per boom 40 à 50 liter vloeistof verbruikt worden, voor 700 boomen (10 ha) heeft men dus 30000 liter vloeistof noodig. Wordt een 7½% oplossing gebruikt, dan verspuit men 2200 liter vruchtboomcarbolineum, welke, berekend à f 18,— per 100 liter ± f 400,— kosten.

Een eenmalige bespuiting met Bordeauxsche pap eischt ± 25000 liter vloeistof. Voor een 1½% pap is 375 kg kopersulfaat noodig, waarvan de prijs ± f 125,— bedraagt. Kalk is zoo goedkoop, dat men de uitgave daarvoor practisch kan weglaten.

Voor een viermalige bespuiting met Californische pap heeft men 100.000 liter vloeistof noodig. Spuit men met gemiddeld 2%, dan is daarvoor 2000 liter Californische pap noodig, de prijs hiervan bedraagt ± f 200,—.

Bij de eerste Californische pap bespuiting uitgevoerd direct na den bloei, voegt men in den regel loodarsenaat aan de sproeivloeistof toe (3 kg per 1000 liter vloeistof). Voor 10 ha is 75 kg noodig, waarvan de prijs ± f 75,— bedraagt.

In totaal heeft men voor 10 ha derhalve per jaar een uitgave aan sproeikosten:

afschrijving machine.	f 125,—	à f 250,—
onderhoud	f 150,—	
benzine en olie.....	f 100,—	
arbeidsloon	f 325,—	
bestrijdingsmiddelen.	f 800,—	
	f 1500,—	à f 1600,—

Vrij ruw geschat kost een volledige bespuiting dus ± f 150,— per ha. Laat men de carbolineumbespuiting achterwege (wat in sommige jaren mogelijk is) en spuit men alleen tegen de schurftziekte en wormstekigheid, dan zijn de totaal uitgaven per 10 ha ± f 450,— lager. Dan zijn de kosten per ha dus ongeveer f 100,—.

Wordt de bespuiting door loonspuiters uitgevoerd, dan wordt 1 à 1½ ct. per liter verspoten vloeistof berekend. Aan spuitloon bij een volledige bespuiting (6 × spuiten) eischt dit een bedrag van

f 1500 à f 2300. Daarbij komen dan nog de kosten voor de bestrijdingsmiddelen. Voor groote bedrijven is het voordeelig een eigen machine aan te schaffen, kleinere bedrijven kunnen voorloopig beter de bespuiting door loonsproeiers laten uitvoeren. Het valt moeilijk aan te geven, waar de grens ligt, daar kleinere bedrijven intensiever gedreven worden (ondercultures). In dergelijke bedrijven neemt het vloeistof-verbruik per ha belangrijk toe en daarmede stijgen ook de uitgaven van den loonsproeier. Ieder fruitteler moet voor zijn eigen bedrijf vooraf berekenen wat voordeeliger is, het aanschaffen van een sproeimachine of de uitvoering van de bespuitingen door een loonsproeier.

Misschien zal door verbetering van de spuittechniek en door een op ervaring gegronde wijziging in het inzicht van de fruittelers de toestand zich zóó ontwikkelen, dat ook de kleinere bedrijven een eigen machine in gebruik nemen. Het zal dan zoo zoo zijn, dat groote bedrijven groote machines en kleinere bedrijven kleine machines bezitten.

Bij de berekening kunnen de volgende gegevens gebruikt worden.

		Vloeistofgebr. bij carbolineum-bespuiting	Vloeistofgebr. bij Bord. of Cal. pap bespuiting
Hoogstamappel....	kroondoorsnede ± 8 m	30 à 40 liter	20 à 25 liter
„ „	„ ± 4 m	15 à 20 „	10 liter
„ peer	stamomvang 40 cm	20 à 25 „	15 „
Flinke pyramide...	hoogte ± 4 m	20 à 25 „	15 „
boomgaard	doorsnede 2 m	2 à 3 „	2 „
Bessenstruik	per ha	± 3000 „	± 2000 liter

Zooals reeds op blz. 41 is aangegeven, kan men in kleinere bedrijven in plaats van een rijdbare machine een vaststaande gebruiken. De aanschaffingskosten zijn dan lager, ook het onderhoud zal bij een goede opstelling, b.v. in een schuur, minder vergen.

Is men op grond van berekeningen tot de conclusie gekomen, dat het aanschaffen van een sproeimachine de voorkeur verdient boven de uitvoering van de bespuitingen door een loonsproeier, dan rijst de vraag, welke machine gekocht moet worden.

De beantwoording van deze vraag is uiterst lastig, daar men eerst door jarenlange ervaringen voldoende gegevens verkrijgt voor een juiste beoordeeling.

Het is voorloopig alleen mogelijk algemeene richtlijnen te geven.

1°. De installatie moet, in verband met den aard van het bedrijf, zoo doelmatig mogelijk zijn. In boomgaarden, waar op vele

plaatsen water aanwezig is, verdient een machine met klein reservoir de voorkeur (slechts één paard noodig; tijd, welke met vullen verloren gaat, vrij gering), is slechts op één punt water te verkrijgen, dan dient men een machine met groot reservoir te nemen, wel heeft men dan twee paarden noodig, doch men spaart veel tijd uit, omdat men minder vaak behoeft te vullen.

2°. Bij onderbeplanting van aardappels of bieten zal men een breede machine verkiezen, bij een ondercultuur van bessen is waarschijnlijk een smalle machine beter. In sommige gevallen zal een hooge machine beter voldoen dan een lage. Met tweewielige machines kan men gemakkelijk wenden, zij eischen een vasten grond.

3°. Vaststaande machines zijn geschikt voor niet te groote bedrijven en voor lange, smalle perceelen.

4°. Voor boomgaarden, vooral met hooge en breede boomen, heeft men een krachtige machine en pompen met groote capaciteit noodig. In fruittuinen met kleine en lage struiken kan men lichtere motoren en pompen met geringer vloeistofverplaatsing gebruiken.

5°. Het is niet de hoofdzaak in korten tijd veel vloeistof te bespuiten, maar om de boomen goed en van alle kanten te raken.

6°. De machines moeten zoo eenvoudig en solide mogelijk gebouwd zijn, een eenvoudige bediening is gewenscht, opdat ook weinig technisch onderlegde personen er mede kunnen werken.

7°. De onderdeelen moeten bestand zijn tegen de verschillende sproeivloeistoffen, gummi-onderdeelen moeten met het oog op de carbolineumbespuitingen zooveel mogelijk vermeden worden. Waar kogels als kleppen dienst doen, moeten deze liefst ook van metaal zijn.

8°. Onderdeelen moeten spoedig leverbaar zijn en gemakkelijk aangebracht kunnen worden; tijdens het sproeien moet er zoo weinig mogelijk stagnatie zijn.

9°. Men moet letten op het gewicht van de machine. De geheel met vloeistof gevulde machine moet nog goed door den boomgaard verplaatst kunnen worden. Hoe zwaarder de machine is, hoe breeder ook de velgen moeten zijn, groote wielen zijn vooral in boomgaarden met greppels beter dan kleine wielen. Bij de vierwielige machines moeten, om goed te kunnen wenden, de voorwielen onder het chassis kunnen doordraaien.

10°. De vloeistof moet gemakkelijk uit de pomp verwijderd kunnen worden (aftappen, uitblazen). Blijft er vloeistof in de pomp staan, dan is 's winters de kans zeer groot, dat de cylinders stuk vriezen.

Behalve op deze punten van technischen aard is het wel goed

hier op één zuivere handelskwestie te wijzen.

Het verdient aanbeveling bij aankoop van een motorsproeimachine in de koopovereenkomst de capaciteit van motor en pomp te vermelden. Mocht later twijfel over de capaciteit ontstaan, dan kan door berekening nagegaan worden of de geleverde machine aan de overeenkomst voldoet.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN

Plaat I.

Fig. 1. Rugpulverisateur met handpomp.
,, 2. Handpulverisateur (automatisch).
,, 3. Groote automatische rugpulverisateur.
,, 4. Tonspuit.

Plaat II

,, 5. Batterijspuit.
,, 6. Week's rijdbare sproeimachine.
,, 7. Sproeigeweer.

Plaat III

,, 8. Aardappelsproeimachine.
,, 9. Meervoudige verstuiver.

Plaat IV

,, 10. Sproeien in de kas.
,, 11. Sproeien op het veld.

Plaat V

,, 12. Vaste motorpompinstallatie; links pomp, rechts reservoir.
,, 13. Electrisch gedreven motorpomp, op vorige afbeelding links zichtbaar.

Plaat VI

,, 14. Platz motorsproeimachine.
,, 15. Hardie motorsproeimachine.

Plaat VII

,, 16. Bean motorsproeimachine.

Plaat VIII

,, 17. Sproeien in den boomgaard.

De cliché's van de afbeeldingen 5 en 14 werden ons welwillend afgestaan door de fa. Platz, Ludwigshafen (Duitschland), de cliché's van de afbeeldingen 7 en 15 ontvingen wij in dank van de fa. Kempkes en Waterreus te Elst en de cliché's van de afbeeldingen 9, 16 en 17 van den Heer van Heijst te Utrecht.



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6



Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12



Fig. 13

Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16

Fig. 17

PUBLICATIES VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST

verkrijgbaar tegen den hieronder vermelden prijs bij den **Inspecteur, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen.**

Postrekening 18018.

Vlugschriften:

Prijs 4 cts. per stuk + verzendkosten, bedragende voor 1 ex. 3 cts. 10 ex. 5 cts., 50 ex. 10 cts.

1. Bladluizen.
2. Schildluizen.
3. Bladaaltjes.
4. Resultaten van proeven met Californische pap.
5. Sproeimachines.
6. Bordeauxsche pap en Normaalpappoeder.
7. Californische pap.
8. Carbolineum en andere sproeimiddelen tegen dieren.
9. Selderieziekten.
10. Koolziekten.
11. Eenige Rhododendron-vijanden.
12. Eenige belangrijke rozenvijanden.
13. De kankerziekte der ooftboomen.
14. De kleine wintervlinder.
15. De fritvlieg.
16. Zaaigraanontsmetting.
17. De bessenbladwesp.
18. Bestrijding van steen- en stuifbrand in tarwe en gerst.
19. Het stengelaaltje.
20. Het bieten- of haveraaltje
21. Het wortelaaltje.
22. Graanroest.
23. Vlekken- en Macrosporiumziekte der boonen.
24. Vlekkenziekte der erwten.
25. Bietenwortelbrand.
26. Aaltjesziekten in bolgewassen.
27. Aardappelwratziekte.
28. Rondknop bij zwarte bessen.
29. Bloediuis.
30. De slakvormige bastaardrups der ooftboomen.
31. Beukenwolluis.
32. De zgn. „meeldauw" der tomaten.
33. De elzen- en wilgensnuittor (*Cryptorrhynchus lapathi L.*).
34. Wilgenhaantjes.
35. Iepenspintkevers.
36. Het spint (roode spin).
37. De klaverkanker.
38. Pokziekte van het pereblad.
39. Bestrijding van den Amerikaanschen kruisbessenmeeldauw.
40. De bestrijding der emelten.
41. Ontsmetting van aardappelen met Sublimaat.
42. Drinkbakken voor vogels en andere dieren.
43. De bietenvlieg (*Anthomyia conformis Fall = Pegomyia hyoscyami Panz*).
44. Thrips.
45. Iets over de beteekenis van de vogels voor onze cultures.

PUBLICATIES VAN DEN PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST

verkrijgbaar tegen den hieronder vermelden prijs, franco per post bij den **Inspecteur, Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen.**

Postrekening 18018.

Mededeelingen:

1. De spruitvreter of knopworm der bessestruiken, 4e dr. f 0,35.
2. De roode worm der frambozen, 3e dr. f 0,35.
3. De trekmade, 3e dr. f 0,25.
4. Brandziekten van granen, 3e dr. f 0,30.
5. Dopluis op perzik en druif, 2e dr. f 0,25.
6. Aardappelziekten, waarmede rekening moet worden gehouden bij de veldkeuring en bij de selectie, 5e dr. f 0,40.

6a. Guide pour l'inspection aux champs et pour la sélection des pommes de terre. f 0,40

7. Insectenschade op gescheurd grasland in 1918, 2e dr. f 0,15.
8. De koolvlieg (*Chortophila brassicae* Bché), 2e dr. f 0,25.
9. Ziekten van aardappelknollen, 4e dr., f 0,25.
10. De loodglansziekte onzer ooftboomen, 3e dr. f 0,20.
11. Plantenziekten, waarmede rekening moet worden gehouden bij de veldkeuring, 2e dr. f 0,20.
12. Verslag over de werkzaamheden van den Phytopathologischen Dienst in het jaar 1919. Uitverkocht.
13. Le service phytopathologique aux Pays-bas 2e éd. f 0,15.

13a. The Phytopathological Service in the Netherlands. 3rd ed. f 0,25.

13b. Statens Plantepatologisk kontor i Nederlandene. f 0.15

13c. El Servicio fitopatologico en los Paises Bajos. f 0.15.

14. De bescherming van den mol. f 0,20.
15. Proefnemingen met rook, ter bescherming van gewassen tegen nachtvorsten. Uitverkocht.
16. De aardappelwratziekte, 2e dr. f 0,25.

16a. Black scab (wart disease) in the Netherlands. f 0,25.

16b. La maladie verruqueuse (gale-noire) des pommes de terre aux Pays-Bas. f 0,25.

16c. Der Kartoffelkrebs in den Niederlanden. f 0,25.

17. Vogelkultuur door middel van nestkasten, 4e druk, f 0,25.
18. Plantenziektenkundige waarnemingen I: Iepenziekte, Cattleyakevertje, Tarweontsmetting. f 0,30.
19. Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen I. 2e dr. f 0.30.
20. Wormstekigheid bij appel en peer, 2e dr. f 0.25.
21. Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen II. f 0,35.
22. Plantenziektenkundige waarnemingen II: Gezondheidstoestand van te velde gekeurde aardappelen, Gal aan Arabis alpina, Vogelcultuur in fruittuinen. f 0,35.
23. De strepenziekte van de gerst. f 0,30.
24. Plantenziektenkundige waarnemingen III: Iepenziekte, Chloroclystis rectangulata. f 0,45.
25. Bestrijding van tomatenziekten in Engeland (reisverslag). f 0,15.
26. Ziekten en beschadigingen van tomaten, 2e dr. f 0,45.
27. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in de jaren 1920 en 1921. f 1,—.
28. Plantenziektenkundige waarnemingen IV: Over emelten. f 0,45.
29. De groote en de kleine Narcisvlieg. f 0,10.
30. Vogelcultuur en Vogelstudie 1922. f 0,35.
31. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1922. f 0,45.
32. Het vroeg rooien van aardappelen voor pootgoed en de bewaring in moderne pootaardappelbewaarplaatsen, 2e dr. f 0,15.
33. Sproeien en Sproeiers, 3e dr. f 0,40.
34. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1923. f 0,60.
35. Plantenziektenkundige waarnemingen V: Kool: Rotstronken, Stippel- en Randjeskool. f 0,50.
36. De Plantenziektenkundige Dienst in Nederland, 2e dr. f 0,55.
37. De herdenking van het 25-jarig bestaan van den Plantenziektenkundigen Dienst, 29 November 1924. Uitverkocht.
38. De Spreeuw. f 0,15.
39. De Roek in Nederland. f 0,15.
40. Onderzoek naar de vatbaarheid van aardappelsoorten voor de wratziekte in de jaren 1922-'24. f 0,20.
41. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1924. f 0,50.
42. Plantenziektenkundige waarnemingen VI: Een studie over emelten. f 1,40.
43. Middelen tegen plantenziekten en schadelijke dieren in land- en tuinbouw, 2e dr., f 0.15.
44. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1925. f 0,90.
45. Smalle graanvlieg en fritvlieg. f 0,25.
46. De berichtendienst van den Plantenziektenkundigen Dienst. f 0,15.
47. Aantasting van suikerbieten en mangelwortels door *Phoma betae* Frank. f 0,25.
48. Het blauw-worden van aardappelen. f 0,25.
49. Insectenbestrijding uit vliegtuigen. f 0,60.
50. De schurftziekte bij appel en peer, 2e dr. f 0,20.
51. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1926. f 0,80.
52. De aardappelziekte (*Phytophthora infestans*), f 0,15.
53. Een waarschuwingsdienst voor het optreden van de aardappelziekte. f 0,10.
54. Draaihartigheid bij kool. f 0,20.
55. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1927. f 0,80.
56. Plantenziektenkundige waarnemingen VII: Knopvraat van meezen aan roode bes, Mijten aan komkommer, Randjesziekte roode bes, Gele Hortensia's, Tomatenkanker. f 0,20.
57. Rapport over de middelen ter voorkoming van schade door spreeuwen in boomgaarden en fruittuinen. f 0,10.
58. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1928. f 0,80.
59. Rupsenplagen: Bastaardsatijnvlinder, plakker, ringelrups, satijnvlinder en spinselmot, 2e dr. f 0.30.
60. Plantenziektenkundige waarnemingen VIII: De iepenziekte en de iepenspintkevers, Eenige oude gegevens over ziekten in boomen (vnl. in iepen). f 0.35.
61. Vermeende en werkelijke gevaren verbonden aan het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. f 0.20.
62. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1929. f 1.20.
63. Grondontsmetting. f 0.35.
64. Verslag over de werkzaamheden van den Plantenziektenkundigen Dienst in het jaar 1930. f 1.40.